

**Licenciatura en Enfermería.**

**MATERIA:**

**PATOLOGÍA DEL ADULTO.**

**TEMA:**

**PATOLOGÍAS DIGESTIVAS.**

**ALUMNA:**

**KENIA GUADALUPE MONTEJO MENDEZ.**

**DOCENTE:**

**LIC. ENF. JUANA INÉS HERNÁNDEZ.**

**VILLA HERMOSA, TABASCO. FECHA: 11 DE JULIO DEL 2020.**



## PATOLOGÍAS DIGESTIVAS.

Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

## PROBLEMAS GÁSTRICOS.

Cáncer de estómago.

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago, la cual puede ser benigna o maligna.

**Afección maligna: adenocarcinoma gástrico:** suele surgir como consecuencia de una compleja interacción entre la infección por *Helicobacter pylori*, la propia predisposición genética y la alimentación.

Síntomas.

Síntomas iniciales suelen ser molestias abdominales en la zona del estómago, puede surgir o no náuseas y vómitos, malestar general pérdida de peso.

Gastritis.

Es una enfermedad estomacal y digestiva, que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo (lo que depende de su causa y del tratamiento médico prescrito) puede presentarse de manera aguda o crónica.

**Gastritis aguda:** tiende a estar producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, incluso por el consumo de determinados medicamentos principalmente aquellos que son inflamatorios, consumo de bebidas alcohólicas.

**Gastritis crónica:** puede ser causada por determinantes infecciosos, por el consumo continuado y excesivo de bebidas alcohólicas, por el consumo de tabaco y posteriormente por la anemia perniciosa.

Úlcera gástrica.

Son llagas dolorosas en el revestimiento del estómago y son un tipo de enfermedad de úlcera péptica. Se denomina úlcera péptica a cualquier úlcera que afecta tanto al estómago como al intestino delgado.

Causas.

Una infección con la bacteria *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), o el uso a largo plazo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno.

## PROBLEMAS ESOFÁGICOS.

### Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

#### Síntomas.

Acidez (pirosis) y/o la regurgitación ácida.

dolor de pecho, jadeos, dolor de garganta, afonía por irritación causada por el contenido ácido en la laringe, tos, asma o dificultad respiratoria por aspiración de ácido por la vía respiratoria, entre otros.

### Cáncer de esófago.

se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia fuera (a través de la submucosa y la capa muscular).

#### Tipos.

#### **Carcinoma de células escamosas:**

Este tipo de cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago, pero es más común en la porción del esófago de la región del cuello y en los dos tercios superiores de la cavidad torácica.

#### **Adenocarcinoma:**

son los cánceres que se originan de células glandulares (células que producen mucosidad).

Este tipo de cáncer ocurre generalmente en la parte distal (tercio inferior) del esófago.

## PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL.

### Colitis ulcerosa.

La colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca una inflamación duradera y úlceras (llagas) en el tubo digestivo.

- Diarrea, que suele tener sangre o pus
- Dolor y cólicos abdominales
- Dolor en el recto
- Sangrado rectal (evacuar heces con una pequeña cantidad de sangre)
- Necesidad urgente de defecar
- Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia
- Adelgazamiento
- Fatiga
- Fiebre

### Cáncer de colon.

Se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorectal se puede evitar en su mayor parte detectando y reseando los pólipos adenomatosos del colon.

Las personas con mayor peligro de cáncer de colon incluyen aquellas con el antecedente de enteropatía inflamatoria, pólipos colorectal, el antecedente familiar de pólipos adenomatosos o cáncer en parientes de primer grado, o algunos síndromes cancerosos familiares.

### Ostomías.

Es una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

En ciertas ocasiones y dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la intervención, el cirujano decide realizar una estoma. Enfermedades como el cáncer de colon, cáncer de recto, diverticulitis con peritonitis.

## PROBLEMAS ABDOMINALES.

### Enfermedad diverticular.

Los divertículos son bolsas que se forman en las paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide, pero pueden abarcar todo el colon.

La diverticulitis describe la inflamación o complicaciones debidas a estas bolsas.

La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con precisión, pero es más común en las personas que consumen una dieta baja en fibra.

### Apendicitis aguda.

es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y, a menudo, se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen
- Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos
- Náuseas y vómitos
- Pérdida de apetito
- Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza
- Estreñimiento o diarrea
- Hinchazón abdominal
- Flatulencia.

### Hernias.

Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

El tipo de hernia depende de la ubicación.

Hernia femoral es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres.

Hernia hiatal se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax.

Hernia umbilical es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el musculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento.

Hernia inguinal es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres, puede bajar hasta el escroto.

## PROBLEMAS DE RECTO Y ANO.

### Hemorroides.

son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas. Las hemorroides pueden desarrollarse dentro del recto (hemorroides internas) o debajo de la piel alrededor del ano (hemorroides externas).

#### Síntomas de hemorroides externas:

- Picazón o irritación en la zona anal
- Dolor o molestia
- Hinchazón alrededor del ano
- Sangrado

#### Síntomas de hemorroides internas:

- Sangrado indoloro durante las deposiciones. Puedes notar pequeñas cantidades de sangre de color rojo brillante en el papel higiénico o en el inodoro. Una hemorroide que empuja a través de la abertura anal (hemorroide prolapsada o protuberante), lo que provoca dolor e irritación.

### Fisura anal.

Una fisura anal es un pequeño desgarró en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano.

- Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación intestinal
- Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas
- Sangre roja brillante en las heces o en el papel higiénico luego de la evacuación intestinal
- Una grieta visible en la piel alrededor del ano
- Un bulto pequeño o un fibroma blando en la piel cercana a la fisura anal.

### Fistulas anales.

es una conexión anormal entre la superficie interna del canal anal y la piel que rodea la región perianal.

Las fístulas anales de por sí no tienden a causar daño ni dolor, pero pueden ser irritantes por razón del drenaje de pus, así como la incomodidad de algunas fístulas de pasar material fecal por su luz. Además, los abscesos recurrentes pueden causar cierta morbilidad a corto plazo, como dolor e infección. Una fístula puede causar picazón y un absceso infectado puede causar enfermedad sistémica.



