



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
UNIVERSIDAD UDS**

PLANTEL VILLAHERMOSA

Licenciatura en Enfermería

PATOLOGIA DEL ADULTO

“Mapa conceptual”

Presenta:

FLOR ADRIANA CRUZ RODRIGUEZ

Asesor:

PRIEGO JIMENEZ GABRIELA

PALENQUE, CHIAPAS

JULIO DE 2020

Patologías digestivas

Son trastornos del aparato digestivo, algunas veces se denominan tracto gastrointestinal.

¿Cuáles son?

Gastroenteritis

Es:

Inflamación de la mucosa del estómago y del intestino.

Es causada por:

Una infección vírica que se transmite con facilidad de una persona a otra.

Signos y síntomas:

- Pérdida de apetito.
- Náuseas.
- Diarrea.
- Dolor abdominal.
- Fiebre.
- Debilidad.

Gastritis

Es:

Inflamación del revestimiento del estómago.

Su duración es de:

Puede durar solo por un corto tiempo (aguda) o permanecer durante meses o años (crónicas).

Síntomas:

Se presenta con sensación de ardor o dolor en la boca del estómago.

Úlcera péptica

Es:


Una llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino delgado superior.

Se producen en:

Cuando la capa protectora del intestino se resquebraja.

Dañan:

Los jugos digestivos pueden dañar el tejido del intestino o del estómago.



Problemas gástricos

Surgen de:

Surgen a causa de anomalías en el interior o en el exterior de los intestinos y su intensidad varía desde las que producen síntomas leves y las que causan manifestaciones intratables.

Pueden ser:

Gastritis

Úlcera gástrica

Cáncer de estómago

Es:

Una enfermedad estomacal y digestiva que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el estómago.

Causa:

Es conocida como úlcera péptica, causa clásicamente dolor quemante o retortijones con frecuencia de aparición nocturna.

Aparece a consecuencia de:

Una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago, la cual puede ser benigna o maligna.

Puede presentarse en:

Gastritis aguda

Gastritis crónica

Producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, incluso por el consumo de determinados medicamentos principalmente aquellos que son inflamatorios.

Puede ser causada por determinadas infecciones, por el consumo continuo y excesivo de bebidas alcohólicas, por el consumo de tabaco y posteriormente por la anemia perniciosa.

Se puede evaluar:

- Serología.
- Prueba de urea en el aliento.
- Endoscopia con biopsia.

Síntomas iniciales:

- Molestias abdominales.
- Náuseas.
- Vómito.
- Malestar general.
- Pérdida de peso.

Problemas del tracto intestinal.

Alguno de los problemas del tracto es:

Colitis ulcerosa:

Es:

Enfermedad intestinal inflamatoria crónica que provoca la inflamación del tracto digestivo.

Afecta al:

Suele afectar al revestimiento interno del intestino grueso (colon) y al recto.

Sus síntomas son:

- Sangrado rectal.
- Diarrea con sangre.
- Calambre abdominal.
- Dolor.

Cáncer de colón:

Es:

Es un crecimiento incontrolado de las células del colón y/o el recto.

Sus signos y síntomas son:

- Sangrado rectal.
- Sangrado en las heces.
- Debilidad o fatiga.
- Pérdida de peso sin causa aparente.

Factores de riesgo:

- Edad avanzada.
- Afecciones intestinales inflamatorias.
- Estilo de vida sedentario.

Ostomias:

Es:

Es una exteriorización del intesto en la pared del abdomen con el objetivo de poder evacuar las heces.

Los tipos de ostomias son:

- Colostomía: desvía el tránsito intestinal y/o descomprimir el intestino grueso.
- Ileostomía: se exterioriza el intestino delgado, generalmente en el último tramo, para conservar la mayor parte del intestino posible.

Problemas abdominales.

Son:

Enfermedad diverticular:

Es:

La inflamación o infección en uno o más de los pequeños sacos del tracto digestivo.

¿Qué son las diverticulosis?

Son bolsas que se forman en las paredes del colón, normalmente en la parte izquierda o colón sigmoideo.

Los síntomas son:

- Dolor abdominal.
- Fiebre.
- Nauseas.
- Pérdida de apetito.
- Diarrea.

Apendicitis aguda:

Es:

Enfermedad inflamatoria infecciosa del apéndice, es un apéndice que tiene la parte inicial del intestino grueso, denominada ciego, al ser una inflamación aguda el dolor es de rápido inicio.

Pueden presentarse con:

Comienza con dolor cerca del ombligo, que luego se traslada al lateral derecho.

Los síntomas son:

- Escalofríos.
- Nauseas.
- Vomito.
- Fiebre.
- Pérdida de apetito.

Hernias:

Es:

Un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

El tipo de hernia depende de la ubicación:

- Hernia femoral: es una protuberancia en la parte superior de musculo justo debajo de la ingle.
- Hernia hiatal: se presenta en la parte superior del estómago.
- Hernia quirúrgica: puede darse a través de una cicatriz.
- Hernia umbilical: es una protuberancia alrededor de ombligo, no se cierra completamente después del nacimiento.
- Hernia inguinal: es una protuberancia en la ingle.

Problemas del recto y del ano

Pueden ser:

Hemorroides

Son:

Venas inflamadas o hinchadas alrededor del ano o la parte inferior de su recto.

Pueden ser:

- Hemorroides externas: se forman debajo de la piel, alrededor del ano.
- Hemorroides internas: se forman en el revestimiento del ano y el recto inferior.

Sus causas son:

- Estreñimiento crónico o diarrea.
- Dieta baja en fibra.
- Levantar frecuentemente objetos pesados.

Sus síntomas son:

- Picazón anal.
- Uno o más bultos duros y sensibles cerca del ano.
- Dolor anal, especialmente al estar sentado.

Fisura Anal

Es:

Una herida o desgarro en forma longitudinal que aparece en el margen anal.

Sus síntomas son:

- Dolor intenso.
- Dificultad para evacuar.
- Al finalizar la evacuación.
- Picor.
- escozor.

Tratamiento:

- Llevar una dieta rica en fibra.
- Ingesta de agua adecuada.
- Baño de asiento con agua templada durante 10-15 minutos.

Fistula Anal

Es:

Una conexión anormal entre la superficie interna del canal anal y la piel que rodea la región perianal.

Tipos de fistulas:

- Ciegas: están abiertas en un solo extremo pero conectan a dos estructuras.
- Completas: tienen aberturas tanto adentro como afuera del cuerpo.
- En herradura: conectan a la superficie de la piel después de circundar el recto.
- Incompletas: un tubo desde la piel cerrada en su interior y que no conecta con ninguna estructura interna.

Síntomas:

- Dolor en el recto.
- Secreción o sangrado anal.