

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNA

Zurisadai Pérez González

MATERIA

Prácticas profesionales.

DOCENTE

Lic. Juana Ines Hernández

CARRERA

Lic. Enfermería

CUATRIMESTRE

9°

GRUPO

"F"

ACTIVIDAD

Investigación.

¿Qué es una emergencia?

- Asunto de una situación imprevista que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible.

- Situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente, requiere de una atención inmediata.

Principales emergencias.

- Enfermedad cardiovascular
- Crisis asmáticas
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- Neumonía
- Bronquiolitis
- Enfermedad diarreica aguda.
- Politraumatizados.
- Lipotimias o desmayos.
- Traumatismos
- Patologías Cardiacas.

- 1.) Definir el problema y establecer prioridades
- 2.) Tomar medidas rápidas sobretodo.
- 3.) Asignar tareas
- 4.) Mantener a todo el personal motivado
- 5.) Diferenciar lo urgente de lo importante
- 6.) Ser precavido
- 7.) Actuar con rapidez
- 8.) Saber imponerse
- 9.) Evitar aglomeraciones
- 10.) Tranquilizar al herido.

ANÁLISIS DE RIESGO

Ahogamiento.

Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismo.

Se calcula que en el mundo mueren cada año por ahogamiento 320 000 personas.

El riesgo en ahogamiento es mayor en niños.

- Según el informe mundial sobre los ahogamientos, la edad es uno de los principales factores de riesgo vinculado en general a lapsos de inatención en la supervisión de un niño. A escala mundial, los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 1 a 4 años de edad, seguidos de la franja de edad de 5 a 9 años.
- Un factor de riesgo vivir en un medio rural.
 - Tener mayor acceso al agua es un factor de riesgo.
 - Riesgo de ahogamiento por inundaciones en países bajos y medianos donde se exponen las personas.
 - Consumo de alcohol cerca o dentro del agua.
 - Lactantes desatendidos en bañera o dejar a cargo a un niño menor del cuidado de otro.

ANÁLISIS DE RIESGO

= Convulsiones =

- Algunos de los factores de riesgos son:
- Antecedentes familiares
 - Una lesión en el cerebro producto de un traumatismo, un accidente cerebrovascular.
 - Privación del sueño.
 - Uso de drogas (illegales).
 - Consumo excesivo de alcohol.

Una convulsión de epilepsia mayor causa la pérdida del conocimiento y contracciones musculares violentas.

Cuando se piensa en convulsiones suele imaginarse el cuerpo de una persona que se sacude rápida y sin control, las convulsiones son síntomas de un problema cerebral, aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro.

= Insolación y golpe de calor =

El cuerpo humano para funcionar con normalidad necesita mantener una temperatura de 37°C . Por encima de 38°C se podrán producir daño a la salud. La exposición al calor pueden causar erupción de la piel; edema en extremidades, quemaduras, calambres musculares, deshidratación, agotamiento. Cuando se presenta el golpe de calor la piel se calienta, se seca y cesa la sudoración, aparecen convulsiones, aumenta el ritmo respiratorio y cardíaco.

¿Quiénes tienen mayor riesgos?

- Menores de 5 años, especialmente los de 1 año.
- Niños con enfermedades crónicas, cardíacas
- renales, mentales o neurológicas
- Niños con fiebre o diarrea
- Niños obesos o desnutridos
- Jóvenes que toman bebidas con alcohol y los que se drogan.
- Adultos mayores de 65 años y personas con sobre peso.

= Mordedura o picadura =

Las picaduras de insectos constituyen un motivo habitual de consulta en atención primaria. Se describe que también son producidas por animales como el perro, gato y serpiente. En la actualidad se ha incrementado la moda de tener en el domicilio animales de compañía. Los riesgos de las picaduras de animales dentro o fuera del hogar se incrementan en el verano por alta sensación térmica. Según la Institución Nacional de la Salud, una picadura puede ocasionar desde hinchazón, enrojecimiento hasta la insuficiencia renal o shock anafiláctico, y en casos extremos la pérdida de la vida.

ANÁLISIS DE RIESGO

= Parto Imprevisto. =

Aproximadamente entre un 10 y un 20 por ciento de las mujeres embarazadas pueden sufrir problemas en el parto. Las causas son muy variadas, que la madre tenga 40 años que la gestante haya tenido diabetes gestacional o presencia de hipertensión arterial durante el embarazo, al igual que partos gemelares. Un factor prevenible es la obesidad así como la edad.

= Quemadura. =

Las quemaduras ocasionan aproximadamente 180 000 muertes al año.

Las lesiones por quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad.

Las quemaduras se producen mayormente en ámbito doméstico y laboral.

Las quemaduras son prevenibles.

Factores de riesgo:

- exposición al fuego
- pobreza, medidas de seguridad adecuada.
- tareas domésticas confiadas a niñas pequeñas
- acceso fácil a químicos utilizados

Según los datos más recientes las tasas de muerte por quemadura es mayor en mujeres.

ya que las mujeres están más expuestas al riesgo asociado, los niños son también muy vulnerables.