

VACUNA TIPO SABIN (VOP).

Enfermedad que previene: contra poliomielitis.

Via de administración: oral.

Grupo de edad: se aplicara durante semanas nacionales de salud, una dosis adicional a los niños menores de 5 años y personas mayores de edad en caso de riesgo epidemiológico.

Esquema: una dosis a todos los niños a partir de los 6 meses a 4 años de edad, siempre y cuando hayan recibido al menos 2 dosis de la vacuna pentavalente .


VACUNA DOBLE VIRAL, ANTISARAMPIÓN Y ANTI RUBEOLA (SR).

Enfermedad que previene: contra el sarampión y la rubeola.

Via de administración: subcutánea, aplicar en el brazo izquierdo.

Grupo de edad: se debe vacunar a los hombre y mujeres susceptibles a partir de los 10 años de edad. La población mayor de 10 años de no haber recibido la segunda dosis de la vacuna de SRP o SR.

Esquema: dos dosis con un intervalo de 1 mes en caso de no haber recibido dosis previa de SR o SRP o no estar escrito en la cartilla de vacunación y dosis única en caso de contar con una dosis previa.



¿EN DONDE PUEDES APLICARTE LA VACUNA?

Acude inmediatamente a tu unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de salud correspondiente y aplícate o aplícale las vacunas a tu hija o hijo de acuerdo a las instrucciones del personal de salud.

Recuerda que es muy importante para la salud que se completen los esquemas de vacunación para evitar enfermedades.

Si no cuentas con tu Cartilla Nacional de Salud, acude a la Unidad de Salud, ahí se te proporcionara información y se te repondrá tu cartilla correspondiente.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN

- Es normal que en el sitio de aplicación te aparezca una mancha roja o sientas calor, dolor o molestia. Estos síntomas solo se presentan los primeros 3 días .
- Si el niño o adulto presenta fiebre de 38° o mas, aplique paños de agua tibia en la axila, frente y pies y vístelo con ropa fresca.
- No automedicarse.
- Si presenta enrojecimiento, endurecimiento e inflamación en el sitio de la aplicación , coloca pañitos de agua fría de 10 a 15 minutos quitando y colocando. Evita hacer masajes.



ELABORADO POR: Deyanira Santiago Pacheco.

Lic. en enfermería.

Fundamentos de Enfermería III.

¿QUÉ SON LAS VACUNAS?

Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de graves enfermedades que afectan sobre todo a los niños. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales los protegerán de padecerla.



¿QUÉ VACUNAS DEBES DE APLICARTE?

VACUNA BCG.

Que previene: contra la tuberculosis.

Via de administración: se aplica por vía intradérmica en el brazo derecho.

Grupo de edad: se aplica a todos los recién nacidos o en el primer contacto con los servicios de salud antes del año de edad.

Esquema: dosis única.

VACUNA ANTIHEPATITIS B RECOMBINANTE.

Enfermedad que previene: contra la infección por el virus de la hepatitis B.

Via de administración: intramuscular, en los menores de 18 meses de edad aplicar en el muslo izquierdo, en los mayores de 18 meses, en el brazo derecho.

Grupo de edad: se debe aplicar a todos los recién nacidos en las primeras 12 horas de haber nacido o antes de salir del hospital, máximo 7 días después del nacimiento.

Esquema: la primera dosis se aplica durante las primeras 12 horas de nacimiento, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses de edad.

VACUNA PENTAVALENTE

Enfermedad que previene: contra la difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e infecciones invasivas por *Haemophilus influenzae* de tipo b.

Via de administración: se debe aplicar intramuscular, en el muslo derecho en los menores de 18 meses de edad. Para mayores de 18 meses de edad y dependiendo de su masa muscular, aplicar en el brazo derecho.

Grupo de edad: se debe vacunar a niños menores de 5 años.

Esquema: son cuatro dosis, las tres primera con intervalo de 2 meses entre cada una, la primera a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 y la cuarta a los 18 meses de edad.

VACUNA DPT.

Enfermedad que previene: activa el refuerzo contra difteria, tos ferina y tétanos.

Via de administración: intramuscular, aplicar en el brazo izquierdo.

Grupo de edad: se debe de aplicar a todos los niños de 4 años de edad:

Esquema: refuerzo a los 4 años de edad.

VACUNA ANTIRROTAVIRUS.

Enfermedad que previene: contra la diarrea, causada por rotavirus.

Via de administración: oral.

Grupo de edad: se debe vacunar a todos los menores de 8 meses de edad.

Esquema: dos o tres dosis. La primera dosis debe aplicarse a los 2 meses de edad (puede iniciarse a las 6 semanas de vida) y la última dosis antes de cumplir los 8 meses de edad. El intervalo sugerido es de 2 meses entre cada dosis, con un mínimo de 4 semanas.

VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA.

Enfermedad que previene: contra infecciones por neumococo causadas por *Streptococcus Pneumoniae*.

Via de administración: intramuscular, en menores de 18 meses de edad en el muslo derecho, en niños mayores de 18 meses de edad aplicar en el brazo.

Grupo de edad: de 2 meses a 5 años de edad.

Esquema: aplicar al menos tres dosis; a los 2, 4 y 12 meses de edad.

VACUNA ANTIINFLUENZA

Enfermedad que previene: contra la infección por virus de la influenza tipo A y B.

Via de administración: intramuscular, para niños de 6 a 18 meses de edad se aplicara en el muslo izquierdo.

Grupo de edad: se debe de vacunar anualmente a niños de 6 meses a los 4 años de edad y a los adultos mayores de 60 años y más de edad.

Esquema: dosis anual.

VACUNA TRIPE VIRAL, ANTISARAMPIÓN, ANTIRRUBEOLA Y ANTIPAROTIDITIS (SRP).

Enfermedad que previene: contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Via de administración: subcutánea, aplicar en el brazo izquierdo.

Grupo de edad: aplicar la vacuna en niños de 1 año y 6 años de edad.

Esquema: dos dosis de vacuna, la primera a los 12 meses de edad y la segunda, al cumplir los 6 años o al entrar a la escuela primaria

