## "Dermatitis"

de la Piel, causada por una hipersesibilidad a alergia a algunos componentes ambientales que llamamos alérgenos, entre los que se encuentra acaros de Polvo o del almacera miento de alimentos, pólenes y mohos.


Existen diversos tipos de dermatitis, los Cuales Pueden ser detectodos por medio de estudios como:

- duz de Wood: El procedimiento es llevado acabo

Por una lámpora con lupa en una habitación
oscura, esperando de 2 a 3 minutos paro acomodar
la visión y Poder ver la presencia de una
fluorescencia verdosa en los tallos pilosos.
da fluorescencia en escamas, Costras o Posibles
restos de pomada, No loes. Este estudio se realiza

Con la finalidad de detectar un Posible caso
de der matofitosis Causada principalmente por Nongos)

- Raspado Cutáneo Superficial-Es un procedimiento realizado por una hoja de bisturí en toda la superficie afectada, se recomienda hacer en el borde de los pabellones auriculares, codos y coverjones, recogiendo escamas y contras. Y Pasarla al microscopio para así detectar el tipo de agente ectopico responsable de los problemas en la piel-



- Ros Pado cutanco profundo - Datactor la Presencia de numerosos ácaros adultos o Al Dovernil Chuevo; lorva, ninfa) los cuales provocan Alapecia, Demodex injai, Demodex cati, Demodex Canis. El cual se realiza con una voja de bisteri Con una gota de vosetina, hosta que se sangre pocramente la zona. lenemes que comprender la relevocia de la responsabilidad que tenemos como propietaries à responsables de nuesta animal en caso de ver anomalías en su dermis. DATE UND TOTAL COURT TOP AGOI TO THE COURT ONLY STORY liene que ser revisado por nuestro médica correspondiente para que pueda analizar y detector el coso, así podrá mandarse a hacer los estudios correspondientes y poder llegar a un diagnostico y trata miento del mismo. 'Tipos de dermatitis' - Dermatitis Atopica. the miles one of the order of the standard of the - Dermatitis fungica-- Dermatitis se borreica. - Dermatitis per contacto.