

Importancia de la piel para obtener un diagnóstico en  
Problemas de dermatitis.

La dermatitis es una enfermedad inflamatoria de la piel, causada por una hipersensibilidad o alergia a algunos componentes ambientales que llamamos alergias, entre las que se encuentran ácaros de polvo o de almacenamientos de alimentos, polenes y mohos.

Existen diversos tipos de dermatitis, los cuales pueden ser detectados por medio de estudios como:

- \*Luz de Wood: El procedimiento se lleva a cabo por una lámpara con lupa en una habitación oscura, esperando de 2 a 3 minutos para acomodar, la visión y poder ver la presencia de una fluorescencia verdosa en los tallos pilosos. La fluorescencia en escamas, costras o posibles restos de pomada, no lo es. Este estudio se realiza con la finalidad de detectar un posible caso de la ~~dermatitis~~ dermatitis causada principalmente por hongos.
- Raspado Cutáneo Superficial: Es un procedimiento realizado por una hoja de bisturí en toda la superficie afectada, se recomienda hacer en el borde de los pabellones auriculares, codos y covejones recogiendo escamas y costras y pasarlas al microscopio para así detectar el tipo de agente ectopico responsable de los problemas en la piel.
- Raspado Cutáneo Profundo: Detecta la presencia de numerosos ácaros adultos o juveniles (huevo larva, ninfa) los cuales provocan la alopecia. El cual se realiza con una hoja de bisturí con una gota de vaselina, hasta que se sangre ligeramente la zona.

Tenemos la responsabilidad de detectar cualquier anomalía en nuestros animales

## "Tipos de dermatitis"

### Dermatitis atópica en perros

- D. por alergias a picadura de pulgas (DAPP) Perros
- D. por alergia alimentaria en perros
- D. por picadura de dípteros (moscas) en Perros
- D. Acral por lamido en perros
- D. Hômeda aguda en perros
- D. por contacto en perros
- D. Seborreica en perros
- D. por hongos en perros
- D. Por ácaros en perros
- D. en cachorros de perros.

### Dermatitis Más Comunes.

D. ATÓPICA = Canina (DAC) es una enfermedad inflamatoria de la piel, causado por una hipersensibilidad o alergia algunos componentes ambientales que llamados alérgenos, entre los que se encuentran los ácaros de polvo o del almacenamiento de alimento, polenes y mohos.

D. Fúngica = Se trata de la dermatitis causada por la aparición de hongos. Los canes con un mayor número de arrugas en la piel tienden a sufrir con mayor frecuencia esta dermatitis.  
Es el caso del Sharpei - Bulldog Ingles

1. Seborreica = La seborreica es una enfermedad crónica de la piel producida por efecto de la queratinización, la queratinización es el proceso en el que se forma la capa córnea, que es la más superficial de la piel y está constituida por células muertas que se van renovando constantemente lo que se conoce como descamación.

2. por contacto = Este tipo de dermatitis en perros se produce, como su propio nombre indica, por el contacto por algún elemento irritante que ha causado una reacción. Es típico que se produzca en la zona de la barbilla o los labios por comer en plato de plástico, por ejemplo; en pies y partes del cuerpo sin pelo (Troca, corbejones y escrotos) si la reacción se produce por contacto por agentes químicos como detergentes, disolventes, pinturas e incluso algunos jabones.