



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA
ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

TEMA: LESIONES DERMATOLOGICAS

CATEDRATICO:

DRA. HERNANDEZ AGUILAR KARINA

ALUMNA:

PEREZ MOSHAN LAURA BEATRIZ

SEXTO CUATRIMESTRE

GRUPO "A"

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

A MAYO DEL 2020

Lesiones dermatológicas:

Lesiones básicas primarias:

* Inconsientes

- Macula

* Solidas

- Pápula
- Placa
- Nódulo
- Tumor

* Líquidas

- Vesícula
- Ampolla o flictena
- Pústula
- Quiste

Lesiones elementales secundarias:

* Por pérdida de sustancia:

- Excoriación
- Erosión
- Fisura o rágade
- Úlcera
- Fístula

* Por modificación de lesiones primitivas:

Temporales:

- Escama
- Costra
- Escara

* Por modificación de lesiones primitivas:

permanentes:

- Atrofia
- Esclerosis
- Cicatriz
- Liquefacción

Lesiones básicas primarias.

* Inconsientes:

- Mácula:

Lesión plana circunscrita con cambio de color.



* Solidas:

- Pápula:

Elevada circunscrita, $< 0.5\text{cm}$
Epidermis, unión D-E o dermis.
Acúmulos serosos (tubos o roncha, se caracteriza por cuernescencia), depósitos de sustancias, infiltrados inflamatorios o neoplásicos.



- Placa:

Elevación en meseta, una superficie relativamente grande en comparación con su altura, suele deberse a la confluencia de pápulas.



- Nódulo:

Lesión redondeada, circunscrita, profunda y palpable.



- Tumor:

Lesión masa o nódulo grande que se produce por proliferación celular.



+ Líquidas

- Vesícula:

Lesión elevada, circunscrita, contenido seroso o hemorrágico, < 0.5cm.

Su origen puede ser:

- ✓ Intraepidérmico
 - Eterma intercelular
 - Pérdida de puentes intercelulares (acantolisis)
- ✓ Subepidérmico.



- Ampolla o flictena

Lesión elevada, circunscrita, contenido seroso o hemorrágico, > 0.5cm



- Pústula:

Contiene exudado purulento de color, forma y tamaño variable.



Quiste

Lesión, tipo cavidad con contenido líquido o semisólido de consistencia elástica.



Lesiones elementales secundarias:

*Por pérdida de sustancia:

Excoelación

Superficial por pérdida de epidermis, secundaria al rascado.



Erosión

Lesión deprimida por pérdida de epidermis y dermis papilar.



Fisura o rágade

Crietas lineales que afectan a epidermis y dermis superficial.



• Úlcera:

Pérdida de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo.



• Fístula:

Trayecto anormal que comunica la superficie cutánea con cavidad supurativa o estas entre sí.



* Por modificación de lesiones primitivas: temporales

✓ Escama

Deposito seco, acumulación excesiva de estrato córneo.



✓ Costra

Deposito indurado, por desecación de exudados de la lesión previa.



✓ Escara:

Deposito indurado,
por necrosis cutanea.



* Por modificación de lesiones primitivas permanentes.

✓ Atofia:

Área de adelgazamiento de
la piel que se caracteriza
por la pérdida de vello,
transparencia de vasos
sanguíneos y plegamiento
excesivo.



✓ Esclerosis:

Área de inmaduración de la
piel, que se caracteriza
por la pérdida de vello,
transparencia de vasos
sanguíneos y plegamiento
excesivo.



♥ Cicatriz:

Área de induración de la piel que puede ser debida a proliferación colágena, infiltración celular o edema en dermis o tejido celular subcutáneo y que se caracteriza por dificultad del plegamiento.



♥ Liquefacción:

Área de engrosamiento de la piel que se caracteriza por prominencia de las líneas de la piel, y que generalmente es secundaria al rascado o roce.

