

Universidad Del Sureste
(UDS)

Resumen: Lesiones Dermatológicas Primarias y
Secundarias

Enfermería Médico-Quirúrgica II

Catedrática: Dra. Karina Hernández Aguilar

Alumno: Miguel Ángel López Bolom

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mayo de 2020



RESUMEN: LESIONES DERMATOLÓGICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Lesiones Primarias:

-Inconsistentes:

*Mácula: Lesión plana, circunscrita con cambio de color.



Mácula.
Melasma pecho

-Sólidos:

*Pápula: Elevada, circunscrita, <0.5cm; epidermis, unión D-E o dermis; acúmulos serosos (Habón o roncha, se caracteriza por ser evanescente), depósitos de sustancias, infiltrados inflamatorios o neoplásicos.



Pápula.
Lesiones habonosas



Pápulas.
Eritema multiforme

*Placa: Elevación en meseta, una superficie relativamente grande en comparación con su altura, suele deberse a la confluencia de pápulas.



Placa.
Placas habonosas



Placa.
Psoriasis en placas

*Nódulo: Lesión redondeada, circunscrita, profunda y palpable.



Nódulo.
Eritema nodoso

★ Tumor: Lesión, masa o nódulo grande que se produce por proliferación celular



Tumor; Basalioma

- Líquidas:

★ Vesícula: Lesión elevada, circunscrita, contenido seroso o hemorrágico, < 0.5 cm. Su origen puede ser:

• Intraepidérmico:

• Edema intercelular (espongiosis)

• Pérdida de puentes intercelulares (acantolisis)

• Subepidérmico



Vesículas.
Herpes simple

★ Ampolla o plictema: Lesión elevada, circunscrita, contenido seroso o hemorrágico, > 0.5 cm



Ampolla x

★ Pústula: Contiene exudado purulento, de color, forma y tamaño variable



Pústula.
Herpes cara

* Quiste: Lesión tipo cavidad, con contenido líquido o semisólido, de consistencia elástica



Quiste.
Quiste epidérmico

Lesiones Secundarias:

- Por pérdida de sustancia:

* Excoriación: superficial por pérdida de epidermis, secundario al rascado



* Erosión: Lesión deprimida por pérdida de epidermis y dermis papilar



Erosión.
Ca Basocelular

* Fisura o rágades: Grietas lineales que afectan a epidermis y dermis superficial



Fisura.
Psoriasis palmar

* Úlcera: Pérdida de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo.



Úlcera.
Úlcera vascular secundaria

* Fístula: Trayecto anómalo que comunica la superficie cutánea con cavidad supurativa o éstas entre sí,



Fístula.
fístula arteriovenosa

- Por modificación de lesiones primitivas: temporales

* Escama: Depósito seco, acumulación excesiva de estrato córneo.



Escama.
Psoriasis

* Costra: Depósito indurado por desecación de exudados de la lesión previa.



Costra.

* Escara: Depósito indurado, por necrosis cutánea



Escara.
Dermatofibroma

- Por modificación de lesiones primitivos: permanentes

* **Atrofia:** Área de adelgazamiento de la piel, que se caracteriza por la pérdida de vello, transparencia de vasos sanguíneos y plegamiento excesivo.



Atrofia.
Despigmentación post infiltración

* **Esclerosis:** Área de induración de la piel que puede ser debida a proliferación colágena, infiltración celular o edema en dermis o tejido celular subcutáneo, y que se caracteriza por dificultad de plegamiento.



* **Cicatriz:** Área de regeneración de un defecto cutáneo previo con afectación de dermis; puede ser hipertrofica, atrópica o esclerótica.



Cicatriz.



Cicatriz.
Cicatriz queloidea

* **Liquenificación:** Área de engrosamiento de la piel que se caracteriza por prominencia de las líneas de la piel, y que generalmente es secundaria al rascado o roce



Liquenificación.
Psoriasis plantar