


HISTORIA NATURAL DE LA GASTROENTERITIS

PERIODO PRE-PATOGÉNICO.		PERIODO PATOGÉNICO.		
<p>Conjunto de trastornos producidos por la inflamación de la mucosa gástrica e intestinal y cuyo síntoma principal es la diarrea.</p> <p>AGENTE: Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, Sapovirus, Stafilococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia.</p> <p>HUESPED: Lactantes, niños menores de cinco años, ancianos, personas inmunodeprimidas.</p> <p>AMBIENTE: Países en desarrollo, Hacinamiento, baños públicos, nivel socioeconómico bajo.</p>		 <p>Signos y síntomas.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diarrea. -Náuseas y vomito. -Dolor abdominal. -Fiebre. <p>Cambios tisulares.</p> <p>El síntoma principal es la diarrea con aparición de heces de menor consistencia y/o mayor numero, las cuales puede contener moco y/o sangre.</p> <p>Daños y secuelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Deshidratación leve. -Septicemia. - Síndrome del intesti irritable. -Mucosas secas. <p>Convalecencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deshidratación moderada. Desnutrición. Anemia. Shock. <p>HC Es corto de 3 a 5 días (no más de 2 semanas)</p>		
Prevención primaria.		Prevención secundaria.		Prevención terciaria.
Promoción y fomento	Protección específica	Dx. Precoz y TX. oportuno	Limitación del daño.	Rehabilitación.
<ul style="list-style-type: none"> -Promoción sobre el correcto lavado de manos. -Educación en el lavado y desinfección de los alimentos. -Fomentar que no se consuman alimentos en las calles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavado correcto de manos. -Desinfección. -Aplicación de la vacuna de Rotavirus. 	<ul style="list-style-type: none"> -Clínica. -Historia Clínica. -Biometría Hemática. -Coprocultivo. -Iniciar planes de hidratación. -ministración de fármacos según prescripción médica. -Dieta adecuada. 	<ul style="list-style-type: none"> -Hidratación con suero fisiológico o solución ringer lactato según indicación. -Evaluación de los planes de hidratación. -Valoración del estado neurológico. 	<ul style="list-style-type: none"> -Continuar con la lactancia materna o reiniciar dieta normal según la edad. -En caso de dolor ministrar paracetamol.