



Nombre de alumnos:

Sari Gómez Sánchez

Nombre del profesor:

Hilaria Moreno Hernández.

Nombre del trabajo:

Posiciones del paciente.

Materia:

Practica de Enfermería Clínica.

Grado: 6°

Grupo: "A"

Ocosingo, Chiapas a 24 de julio de 2020

POSICIONES PARA PROPORCIONAR COMODIDAD O CUIDADOS AL PACIENTE

POSICION SUPINO


Es la más usada en cirugía. Se usa principalmente para el abordaje del abdomen, cuello anterior y cirugía de miembro superior.

En cirugía abdominal esta posición de decúbito dorsal es para explorar los órganos internos del abdomen ya sea en casos de apuñalamiento, hemorragias, embarazos y otras.

Para examen de tórax o miembros superiores e inferiores.

Como punto de partida para cambios posturales.

Es ideal para recibir masajes de relajación.




POSICION FOWLER

Esta postura favorece una relajación en la musculatura abdominal permitiendo con ello que respiren mejor. Es una posición utilizada con pacientes en camas articuladas que sufren de problemas respiratorios. ... La postura Fowler también es utilizada en mujeres después del parto para mejorar el drenaje uterino.

Además de una mejoría respiratoria gracias a la expansión máxima del tórax, los pacientes también obtienen unas posturas muy confortables para alimentarse, leer o ver la televisión.

un plano inclinado de tal modo que la espalda forme un ángulo de unos 45 grados con la horizontal. Se obtiene al elevar unos 40-50 cm la cabecera de la cama. Las extremidades inferiores pueden mantenerse flexionadas en mayor o menor ángulo o mantenerse extendidas.



POSICION SEMIFOWLER

Es una posición utilizada con pacientes en camas articuladas que sufren de problemas respiratorios. Esta postura favorece una relajación en la musculatura abdominal permitiendo con ello que respiren mejor.

La posición semi-Fowler es una posición inclinada obtenida elevando la cabeza del lecho 25-40 cm, flexionando las caderas y colocando un soporte bajo las rodillas de modo que se doblen aproximadamente 90°, permitiendo así que el fluido en la cavidad abdominal se acumule en la pelvis.



POSICIÓN DE TRENDELEBURG

Se coloca al paciente boca arriba, pero con la cabeza mas bajo que los pies.

Beneficia el retorno venoso del gran volumen de sangre desde de la vena cava inferior al corazón, haciendo circular mejor el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Para mejorar la circulación sanguínea cerebral y de las extremidades.

Para drenar mucosidad y secreciones bronquiales.

Para evitar cefaleas luego de punción lumbar.

Evitar hemorragias internas.

Recuperación por cirugía de órganos pélvicos.

POSICIÓN DE TRENDELEBURG



POSICION INGLESA

En esta postura, el paciente deberá estar acostado en decúbito lateral izquierdo y con su muslo derecho flexionado y su brazo derecho hacia delante. La cabeza deber estar girada lateralmente. Esta postura es muy frecuente para el traslado de pacientes en ambulancia.

Se utiliza para colocar sondas renales en pacientes inconscientes.

Administración de edemas o post operatorios.

Drenaje de secreciones cuando el paciente no puede trasladarse.

Para la relajación muscular.

POSICIÓN INGLESA



PROCESO DE CAMBIO DE DIALISIS PERITONEAL

La DP se realiza dentro de su cuerpo sin que se deba manipular la sangre. Se infunde un líquido de diálisis estéril en el abdomen donde permanece por un periodo de tiempo, en general, entre 4 y 12 horas.

Luego se drena y se extraen los productos de desecho y el exceso de líquido del interior de la cavidad abdominal. Este procedimiento se repite entre tres y cinco veces al día (diálisis peritoneal continua ambulatoria [DPCA]) o bien se realiza por la noche con la ayuda de una máquina (diálisis peritoneal automatizada [DPA]).