



Nombre de alumnos:

Vanessa Ivette Rodas Martínez.

Nombre del profesor:

DR. Oscar Fabián Gonzales Sánchez

Nombre del trabajo:

“Patologías biliares”

Materia: Patología del adulto

Grado: 6° Cuatrimestre

Grupo: “A”

Ocosingo Chiapas a 03 de Mayo de 2020

COLELITIASIS

La **colelitiasis** es la **formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar.**

En muchas ocasiones no producen ningún tipo de problemas y son diagnosticadas de forma accidental, al hacerse una radiografía del abdomen o una ecografía. En otras ocasiones, sin embargo, pueden producir diversas complicaciones.

CAUSAS

- mujeres, sobre todo si han recibido tratamiento con anticonceptivos orales o si han tenido varios hijos.
- personas obesas.
- personas que consumen dietas ricas en [colesterol](#).
- personas que tienen una brusca pérdida de peso.
- personas con edades avanzadas.
- consumo de algunas medicinas, como los fibratos para bajar los triglicéridos.
- presencia de algunas enfermedades que se caracterizan por destrucción de glóbulos rojos en el interior de la sangre (anemias hemolíticas).

SINTOMAS

- Cólico biliar.
- Coledocolitiasis.
- Pancreatitis aguda.
- Colecistitis

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de colelitiasis se realiza mediante ecografía, observándose piedras en el interior de la vesícula. La ecografía también sirve para diagnosticar las posibles complicaciones, si bien a veces es necesario realizar otras técnicas como un TAC o una colangiografía.

TRATAMIENTO

La presencia de colelitiasis sin complicaciones no requiere ningún tratamiento. **Las indicaciones de operar una colelitiasis (colecistectomía, es decir, quitar la vesícula) son:**

- Síntomas frecuentes (**cólicos biliares**), que interfieren con la vida normal del paciente
- La presencia de alguna complicación previa (**colecistitis o pancreatitis**).
- La presencia de factores que se asocian con un mayor riesgo de complicaciones futuras, como la presencia de una vesícula totalmente calcificada (**vesícula en porcelana**).
- **Pacientes con piedras muy grandes** (mayores de 3 cm) o en una vesícula que tenga una estructura anormal.

COLECISTITIS

La colecistitis es una inflamación de la vesícula. La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, debajo del hígado. La vesícula contiene líquido digestivo (bilis) que se libera al intestino delgado.

Síntomas

Los signos y síntomas de la colecistitis son:

- Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen
- Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda
- Dolor con la palpación del abdomen
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre

Causas

La colecistitis ocurre cuando la vesícula se inflama. Las causas de la inflamación de la vesícula pueden ser:

- **Cálculos biliares.**
- **Tumor.**
- **Obstrucción de las vías biliares.**
- **Infecciones.**
- **Problemas en los vasos sanguíneos.**

Factores de riesgo

Tener cálculos biliares es el principal factor de riesgo de padecer colecistitis.

Complicaciones

La colecistitis puede ocasionar una serie de complicaciones graves, entre ellas:

- **Infección en la vesícula.** Si se acumula bilis en la vesícula, lo que provoca colecistitis, esta se puede infectar.
- **Muerte del tejido de la vesícula.** Si la colecistitis no se trata, puede provocar la muerte del tejido de la vesícula (gangrena). Es la complicación más frecuente, especialmente, en las personas mayores, las que tienen diabetes y quienes esperan para recibir tratamiento. Esto puede provocar un desgarro o una rotura en la vesícula.
- **Desgarro de la vesícula.** Un desgarro (una perforación) en la vesícula se puede producir a partir de una inflamación, una infección o la muerte del tejido de la vesícula.

Diagnóstico

Las pruebas y los procedimientos que se utilizan para diagnosticar colecistitis comprenden:

- **Análisis de sangre.**
- **Pruebas de diagnóstico por imágenes de la vesícula.**
- **Una exploración que muestra el movimiento de la bilis en el cuerpo.**

Tratamiento

Por lo general, el tratamiento de la colecistitis requiere una estancia hospitalaria para controlar la inflamación de la vesícula. A veces, se necesita una cirugía.

CANCER DE VESICULA

El cáncer de vesícula es un tipo de cáncer que se origina en la vesícula biliar.

La vesícula es un órgano pequeño, con forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen, justo debajo del hígado. La vesícula almacena la bilis, un líquido digestivo producido por el hígado.

Síntomas

Algunos signos y síntomas del cáncer de vesícula pueden ser:

- Dolor abdominal, especialmente en la parte superior derecha del abdomen
- Hinchazón abdominal
- Fiebre
- Adelgazamiento sin proponértelo
- Náuseas
- Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)

Factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de vesícula comprenden:

- **Sexo.** El cáncer de vesícula es más frecuente en mujeres.
- **Edad.** El riesgo de padecer cáncer de vesícula aumenta a medida que aumenta la edad.
- **Antecedentes de cálculos biliares.** El cáncer de vesícula es más frecuente en personas que han tenido cálculos biliares en el pasado. Aun así, el cáncer de vesícula es poco frecuente en estos casos.
- **Otros trastornos y enfermedades de vesícula.** Otros trastornos vesiculares que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de vesícula comprenden los pólipos en la vesícula y las infecciones de vesícula crónicas.

DIAGNOSTICO

- **Cirugía exploratoria.**
- **Pruebas para examinar las vías biliares.**
- **Pruebas de diagnóstico por imágenes.**

TRATAMIENTO

- **Cirugía para remover la vesícula.** Un cáncer incipiente que está confinado a la vesícula se trata con una operación para remover la vesícula (colecistectomía).
- **Cirugía para remover la vesícula y una parte del hígado.** El cáncer de vesícula que se extiende más allá de ese órgano y dentro del hígado se trata mediante una cirugía que remueve la vesícula, como también las partes del hígado y los conductos biliares que rodean la vesícula.