



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

PLANTEL OCOSINGO

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

CASO CLÍNICO, PACIENTE CON LITIASIS RENAL.

ALUMNA:

LESLIE SANDOVAL GARCIA

DOCENTE:

LIC. JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA

1° GRUPO "A"

OCOSINGO, CHIAPAS

18/06/2020

LITIASIS RENAL

CASO CLINICO:

INGRESA PACIENTE DE 45 AÑOS DE EDAD PRESENTANDO DOLOR EN LA REGIÓN LUMBAR DE MODERADA INTENCIDAD, FIEBRE Y DISMINUCIÓN DE LA ORINA.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: Mariano Rosales Sánchez

FECHA DE NACIMIENTO: 23/08/1973

EDAD: 45 años

COLONIA: Av. Tuxtla Gutiérrez s/n

SEXO: masculino

OCUPACIÓN: albañil

N° DE CAMA: 03

DIA DE INGRESO: 19/06/20

NUMERO DE CELULAR: 916 100 54 56

ESCOLARIDAD: secundaria

SE OBSERVA DIFICULTAD AL ESTAR EN UNA POSICIÓN RECTA, NO MANTIENE CONTACTO VISUAL, SE ENCUENTRA ERGIDO, EL ASPECTO DE SU ROSTRO SE VE PREOCUPADO.

- La litiasis renal también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias (uréteres o vejiga).
- Causada por el incremento de sales en la orina, calcio, ácido úrico y oxalato
- Cuadro clínico: cólico nefrítico, dolor en la zona lumbar que irradia hacia el abdomen, dolor intenso, náuseas, vómitos, sudoración e hinchazón abdominal, hematuria, infecciones en la orina.
- Diagnóstico:
 - o análisis de orina (EGO) Examen general de orina

- haciendo la prueba del golpecito en la espalda
 - Análisis de sangre
 - Radiografía
 - Urografía endovenosa
 - Urografía retrógrada
 - Ecografía abdominal
 - Tomografía computarizada
- Tratamiento:
- Suele expulsarse espontáneamente
 - Litotricia extracorpórea
 - ureteroscopia

P: presencia de dolor en la región lumbar que al golpear irradia al cuadrante flanco derecho.

E: Consumo excesivo de alcohol y refrescos

S: dolor, fiebre, leve presencia de hematuria, cólicos, náuseas y disminución de la orina

DIAGNÓSTICO: DIAGNOSTICO REAL

DOMINIO: 3

CLASE: 1

DX: DETERIORO DE LA ELIMINACIÓN URINARIA

DEFINICIÓN: disfunción en la eliminación urinaria

Retención de la orina relacionado con obstrucción anatómica

DIAGNÓSTICO: DIAGNÓSTICO DE RIESGO

DOMINIO: 3

CLASE: 1

DX: RETENCIÓN URINARIA

DEFINICIÓN: vaciado incompleto de la vejiga

Micciones de poca cantidad relacionado con obstrucción del tracto urinario.

PLANEACIÓN:

Se le harán unas pruebas diagnósticas

así mismo se recomienda el reposo del paciente

evitar esfuerzos

no realizar movimientos que induzcan al dolor con la finalidad de aliviar el mismo.