

**Nombre de alumno: MANUEL DE
JESUS TEJEDA MENDEZ**

**Nombre del profesor: MVZ. CARLOS
SANDOVAL MANCIO**

Nombre del trabajo: INVESTIGACION

Materia: ZOOTECNIA EN PORCINOS

Grado: 6TO Cuatrimestre.

**Lic. En Medicina Veterinaria y
Zootecnia.**

Ocosingo, Chiapas a 02 de junio del 2020.

- Disminuir la alimentación paulatinamente
- Llevarla a la sala de maternidad para su observación
- Bañar a las hembras con agua y jabón para así mantener limpias las glándulas mamarias
- Unas 2 semanas antes del parto hacia el día 100 de la gestación se debe aplicar un tratamiento para parásitos internos y externos.

Preparto

Manejo que se realiza a las cerdas

Lactancia

Parto

- Mantener a la cerda fresca (15 a 25 °C).
- Servirle pequeñas cantidades de alimento, 1 a 2 kg, pero varias veces al día (4 a 6) o en la noche si hace mucho calor.
- Obligarla a pararse para que orine, defaque, tome agua y coma.
- Mantener los comederos aseados, sin alimento rancio.
- Quitar el alimento sobrante antes de servir el nuevo.
- Dar alimento húmedo, o usar comederos con bebedero integrado.

- Inyecte una prostaglandina no más de 2 días antes del promedio de la duración de la gestación
- Luego de identificar los signos del parto de la cerda se procede a limpiar la parte posterior de la jaula (piso, jaula, paredes) con agua, cepillo y jabón
- Instalación de una fuente de calor para los cerdos recién nacidos.

Bibliografía:

Manejos - pre-parto, parto y postparto ,David Sanchez Chipres ,Zapopan, Jalisco, México 17 de Febrero de 2005