Nombre de la alumna:

Lesli Esperanza Tomas López

Nombre del profesor:

Lic. lubdí Isabel Ortiz Pérez

Licenciatura:

Enfermería 6to cuatrimestre

Materia:

Enfermería gerontogeriatrica

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema: Aspectos de salud prevalente

“Ciencia y Conocimiento”

Frontera Comalapa, Chiapas a 1 de agosto del 2020

Aspectos de salud prevalente

Alteraciones hidroeléctricas

Agua y electrolitos, equilibrio hidroelectrolítico y ácido base

La única característica común de los diferentes ambientes es la presencia de agua.

De todos los componentes de un organismo, el agua es el más abundante

En general, los tejidos y organismos más jóvenes tienen más agua.

Los tejidos de vitalidad más intensa son más ricos en agua que los inerte

Incontinencia

es la pérdida parcial o total de la capacidad para controlar voluntariamente la expulsión de gases y materias fecales.1 Representa un serio problema que invalida física y socialmente al enfermo.

Se clasifican

Como total o parcial.

el primer caso, la retención de gases y materias fecales sólidas o líquidas es imposible

La incontinencia fecal es consecuencia de la alteración de uno o más de los mecanismos que normalmente aseguran la continencia;

así, de acuerdo con su etiología, se puede clasificar en: idiopática, traumática, neurológica

También la podemos clasificar como mayor o menor

Tratamiento

Una vez establecido el diagnóstico etiológico y entendiendo, dentro de lo posible, la fisiopatología de la incontinencia fecal, podremos seleccionar el tratamiento idóneo para cada caso.

Estreñimiento y diarrea

Los trastornos intestinales son muy frecuentes y afectan a la totalidad de la población.

Dos de los principales trastornos intestinales son

la diarrea y el estreñimiento, que pueden prevenirse mediante una serie de medidas higiénicas y tratarse farmacológicamente

La diarrea, al igual que el estreñimiento, no es una enfermedad, sino un síntoma de un trastorno cuya gravedad depende de la causa que lo origine.

El objetivo del tratamiento de la diarrea es aumentar la absorción intestinal de agua mediante la reducción del contenido de electrolitos luminales o mediante la disminución de la motilidad intestina

Inmovilidad y consecuencia

El síndrome de inmovilidad se origina por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas, condicionados por el envejecimiento y el desuso,

Los más frecuentes son: falta de fuerza o debilidad

La pérdida de la densidad mineral ósea predispone a fracturas osteoporóticas que son una de las principales causas de inmovilidad

Tratamientos de rehabilitación y mantenimiento funcional en centros asistenciales que no están preparados para el adecuado tratamiento de los