



Nombre del alumno: Blanca Azucena Sánchez López

Nombre del profesor: Alfonzo Velásquez Pérez

Licenciatura: Enfermería

Materia: Enfermería Medico Quirúrgico II

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del trabajo

Ensayo del tema: Dermatitis

Frontera Comalapa, Chiapas a 10 de Mayo del 2020

Al hablar del dermatitis nos referimos a una enfermedad específica de la piel en la que hay presencia de prurigo o en otras palabras aquella sensación incómoda que provoque un deseo de rascarse, además otros signos y síntomas como piel seca y exudado es decir una filtración de los vasos sanguíneos a los tejidos más cercanos y es más común en zonas como rodillas, codo, cuello y cara esta enfermedad puede llegar a ser crónica.

Los factores de riesgo son por un componente genético, las cuales si un niño ya presenta este problema los factores que hacen que vuelvan a recaer pueden ser los jabones detergentes, shampoo, jabón de burbujas, gel y jabones líquidos, leche de vaca, huevo y cacahuates.

El diagnóstico para la dermatitis es clínico además hay criterios si el niño presenta piel seca y en áreas de flexión, además presentes en mejillas en niños de 18 meses o menos, además basarse en un diagnóstico en historia personal de alguna enfermedad atópica de familiares, y ver los inicios de signos y síntomas en niños menores de 2 años.

Para identificar una piel dañada tipo secundaria se presenta sangrado, infección, adelgazamiento de la piel. Además se clasifican de acuerdo a su gravedad y de esta manera ver el tipo de manejo que se le dará y estas se clasifican en: limpia, leve, moderada y grave.

Para su tratamiento debe ser farmacológico y es que hay niveles como tal ya lo había mencionado según la gravedad se valorará el nivel del tratamiento, si el daño es limpio se dice que hay que brindar un tratamiento de primer nivel de atención como:

- Aliviar los síntomas
- Prevenir complicaciones
- Cuidado de la piel, tratamiento antiinflamatorio

Además de la utilización de corticoesteroides tópicos pero de la misma manera dependerán de la gravedad de la enfermedad y la zona que está afectada como por ejemplo los corticoesteroides de potencia leve para la DA leve para cara y cuello con un tratamiento corto de 3-5 días.

Los corticoesteroides de potencia moderada para la DA moderada para zonas como axilas e ingle con duración de 7-14 días y en recaídas siempre y cuando este supervisada por un especialista.

Para una DA grave se utilizan los corticoesteroides potentes de la misma manera con un tiempo del tratamiento de 7-14 días y de la misma manera si existieran recaídas todo debe ser supervisado por un especialista que es el dermatólogo.

Algo importante es que no se deben utilizar corticoesteroides de potencia en niños menores de un año lo recomendable es acudir a un especialista en este caso un dermatólogo para prevenir un daño mayor en la piel del niño.

También se puede utilizar un tratamiento farmacológico y este consiste

- Evitar el consumo de alimentos considerados como alérgicos como la leche de vaca, huevos y cacahuete
- La terapia de hipo sensibilidad para polvo y ácaros.

En conclusión decimos que este problema es sumamente grave ya que al no ser tratada este llega afectar gravemente a la piel provocando una necrosis o en otras palabras la muerte de la piel, pero de la misma manera encontramos muchas formas de cómo prevenir que estas se vuelvan sumamente peligrosas para el paciente y para los que los rodean.

Bibliografía

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/033_GPC_DermAtopPed/IMSS_033_08_GRR.pdf