

Nombre del alumno:

Lorena Marisela Vázquez Gómez

Nombre del profesor:

lic. Alfonzo Velásquez Pérez.

Licenciatura:

Enfermería.

Materia:

Enfermería médico quirúrgico II

Nombre del trabajo:

Ensayo del tema:

“dermatitis.”

Dermatitis.

La dermatitis es la inflamación de la piel lo cual provoca picazón hinchazón y enrojecimiento de la piel, puede formar ampollas, supurar o formar una costra o descamarse en ella está la dermatitis atópica es una enfermedad genética que afecta preferentemente a la epidermis provoca mucho picor en la piel que se presenta más en lactantes a partir del segundo mes de vida puede presentarse en niños y menos frecuentemente en adultos.

Los factores que pueden ocasionar dermatitis atópica son múltiples factores alimentarios para ello hay que alimentar con leche materna a los bebés máximo los primeros seis meses de vida para evitar aparición de fenómenos de sensibilización a alimentos también la sustancia que están en el ambiente pueden desarrollar de sintomatología cutánea y finalmente las enfermedades o trastornos inmunológicos que deprimen este sistema pueden propiciar brotes y episodios de dermatitis atópica lo cual decimos que el eczema es el síntoma predominantemente de la dermatitis atópica este excema es muy característico principalmente en niños pequeños.

Se inicia en las zonas de los pliegues de las extremidades, como en los codos, detrás de las rodillas y la parte de adelante del cuello.

Si uno se rasca, la erupción puede despedir líquido y se pueden formar costras provoca muchísimo picor, el prurito es un síntoma que realmente trastorna la calidad de vida de los niños en algunos casos el eczema se puede sobre infectar y provocar complicaciones severas y pues en algunos casos la dermatitis puede generalizarse y entonces infectar a toda la piel y también provocan episodios agudos.

Al presentar dermatitis aguda en niños puede que en la edad adulta esto genere problemas respiratorios que podrían generar asma bronquial. El tratamiento para la dermatitis es la hidratación con cualquier crema hidratante o aceite de parafina, evitar que la piel este continuamente húmeda, bañar al bebé dos veces o tres a la semana.

En esta dermatitis atópica se produce una falta de hidratación en la epidermis que por ello es que ocasiona picor.

Dermatitis de contacto en este subtema hablaremos más a las zonas expuestas que son las manos, los pies, las zonas de la cara sobre todo los párpados y labios por lo general la alergia al sulfato de níquel es muy frecuente en mujeres que se forman pequeñas apoyas o vesículas sobre una base enrojecida que pica mucho pero cuando la exposición es crónica llega un momento que la piel se engruesa y se forma una escama importante y lo que produce es mucho picor.

Ocasionado por las alhajas que contienen níquel, los productos de limpieza, los perfumes, los productos cosméticos e, incluso, los conservantes incluidos en cremas y lociones, para que se produzca esta alergia es necesario estar en contacto con la sustancia sensibilizante y su tratamiento es cremas antiinflamatorias tópicas como corticoides.

La dermatitis seborreica es una enfermedad de la piel que afecta principalmente al cuero cabelludo aunque también puede afectar a otras partes en donde hay una mayor presencia de glándulas sebáceas como puede ser el rostro, las orejas, laterales de la nariz olas cejas algunos síntomas son la presencia se caspa en el cabello, cejas o barba, manchas en la piel con escamas blancas o amarillas incluso costras en el cuero cabelludo, enrojecimiento de la piel y sensación de picor para ello utilizar jabón neutro.

Bibliografía.

www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc20352380. (ARIAS, 2007)