

Nombre del alumno:

Ramirez Roblero Edson Caleb

Nombre del profesor:

Lic. Romelia de León Méndez

Licenciatura:

6to Cuatrimestre “A”, Enfermería Escolarizado

Materia:

Enfermería del adulto

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema:

“Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones oculares”

Pacientes oculares

Patologías más frecuentes

Estrabismo, obstrucción de las vías lacrimales, Toxina botulínica, Úlceras corneales, Cataratas congénitas

Cuidados Generales

Lavado de los ojos

Se deben lavar las manos previamente. El lavado del ojo se debe realizar de afuera hacia el lagrimal con dirección de arrastre de las secreciones, con solución de SSF al 0,9 % utilizando gasas estériles, nunca algodón. Igualmente se limpiarán las pestañas, haciendo hincapié en no hacer presión sobre el globo ocular.

Administración de Colirios

Los colirios son preparaciones líquidas destinadas al tratamiento de las enfermedades oculares. El vehículo de los colirios ha variado según las épocas y en la actualidad se reducen prácticamente a dos: acuoso y oleoso (este último en vías de desaparición).

Tipos de colirios:

Colirios de exploración:

Midriáticos (Tapón rojo)
Producen una dilatación de la pupila por encima de 4 mm. A veces pueden usarse como tratamiento en enfermedades que requieran mantener el ojo en reposo. Ej. Atropina, Ciclopentolato, Tropicamida.
Anestésicos (Tapón amarillo)
No deben usarse nunca como tratamiento

Pueden enmascarar los síntomas al quitar el dolor y por otra parte, la pérdida de sensibilidad puede hacer que maniobras intempestivas originen lesiones corneales. Ej. Lidocaína. Fluoresceína (Tapón naranja) Se utilizan para teñir el epitelio en el diagnóstico de patologías de la superficie de la córnea.

Colirios de tratamiento:

Antibióticos. Los tapones son en Corticoides y Antihistamínicos. Tonos más pálidos Combinados. (Blanco, Azul, Gris) Fórmulas magistrales. Los colirios se conservarán a temperatura ambiente o refrigerada según se

Administración de pomadas.

Las pomadas están compuestas por una sustancia grasa y otros ingredientes. Cargan la película lagrimal de gotitas grasas que molestan la visión durante bastante tiempo. Por lo general, sólo se prescriben por la noche. La mayoría de los colirios tienen su equivalente en pomadas. Se presentan en tubos con un extremo cónico para su fácil aplicación.

Oclusiones oculares.

Se realizarán oclusiones oculares para mantener el ojo en reposo y/o para hacer hemostasia tras una intervención. En caso de que el niño utilice lentes correctoras previamente a la cirugía, deberá ponérselas en el momento que su nivel de conciencia y estado general se lo permita.