



**NOMBRE DE LA ALUMNA:
IRIS DIANETH GARCIA MENDEZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR:
LIC. ROMELIA DE LEON MENDEZ**

**LICENCIATURA:
MODALIDAD, Y CUATRIMESTRE Y GRUPO;
ENFERMERIA ESCOLARIZADO,6TO
CUATRIMESTRE "A"**

**MATERIA
ENFERMERIA DEL ADULTO.**

**MAPA CONCEPTUAL:
VALORACION DE ENFERMERIA.**

Frontera Comalapa, Chiapas a 21 de mayo del

VALORACION DE ENFERMERIA

la utilidad de estos términos consiste en que brindan la posibilidad de identificar la intencionalidad o no que hay detrás de los mismos.

el problema de salud

Son barreras que se han presentado para la prevención

causas de los traumatismos

actos de violencia cometidos contra otros o contra sí mismo, las colisiones en las vías de tránsito, las quemaduras, los ahogamientos, las caídas y las intoxicaciones

causa más importante de muerte

la lesión cerebral traumática es

violencia entre personas

constituye la causa del traumatismo cráneo-encefálico o espino-medular en el 10 % de todos los casos.

uno de los objetivos

reflexionar en torno al problema que representa el uso inadecuado de dichos términos

clasificación más analítica del efecto del traumatismo cráneo-encefálico

permite evaluar el pronóstico, prever el eventual deterioro y adoptar la mejor conducta terapéutica posible

la escala de Glasgow

cuantifica las respuestas visuales, verbales y motoras posibilitando la ubicación del paciente, puntuación es de 15 lo normal.

ESGUINCE

denominado torcedura, es una lesión ligamentosa consecutiva a un movimiento forzado

clasificación de los esguinces dependiendo del tipo de lesión

- Leves
- Moderados
- graves

FRACTURA

es una solución de continuidad de un hueso que se produce por la acción de un agente vulneraste.

clasificación

- ◆ incompleta ◆ completa
- ◆ estable ◆ inestable

LUXACION

una luxación es aquella lesión de una articulación en la que las caras articulares dejan de estar en contacto anatómico.



FRACTURA EN LA BASE DEL CRANEO

la base del cráneo está formada

por el hueso etmoides, el esfenoides, la porción basal de los 2 huesos frontales, los 2 huesos temporales incluyendo su porción petrosa o peñasco y el hueso occipital

provocadas



por la lesión de alguno de los nervios o vasos sanguíneos que atraviesan la base del cráneo

una fractura ósea que afecta a alguno de los huesos situados en el suelo o base de la cavidad craneal.

se define



Atención de enfermería a pacientes problemas musculo esquelético

Los niños dependen del funcionamiento del sistema musculo esquelético para permitir el soporte y movimiento que asegura el desarrollo normal y posibilita la exposición a distintos estímulos

síntomas

- equimosis
- hematoma
- otorragia

COMPLICACIONES

rinorrea de liquido cefalorraquídeo (rinorraquia) por lesión de las meninges que provoca salida de líquido cefalorraquídeo al exterior a través de la nariz.

exploración física



física dependiendo del trastorno o lesión que sospeche. al evaluar los huesos, en caso de sospechar una fractura ver introducción a las fracturas, luxaciones y esquinces.