Nombre del alumno:

Luis Antonio Morales Aguilar

Nombre del profesor:

Ervin silvestre castillo

Licenciatura:

Enfermería

Materia:

Practicas profesionales

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico:

"organización del cuerpo humano"

Frontera Comalapa, Chiapas a 13 mayo del 2020.

- **CVC**
  - **Definición**
    - **Dispositivo IV**
      - **Se sitúa**
        - Extremo distal en la vena cava superior o inferior
          - Antes de la entrada aurícula
    - Implantados
      - Durante largo tiempo
  - **Tipos de catéter**
    - ➢ **Catéter reservorio**
      - Es un catéter central interno
        - Insertado
          - Con técnica tunelizada
      - Su implantación es torácica
        - Situando el reservorio sobre plano muscular
          - Acceso venosos se realiza atreves de venas yugular o subclavia
        - Es procedimiento
          - Médico-quirúrgico
        - Requiere pequeña incisión
          - Introducir el reservorio debajo de la piel
          - Fosa infraclavicular derecha
            - Sobre la tercera o cuarta costilla
      - Descripción del dispositivo
        - Constan de
          - Catéter
            - Silicona o poliuretano
          - Reservorio o puerto
            - Titanio o acero inoxidable
            - Membrana de silicona autosellable
            - Portal o cámara
      - Cuidados zona de implantación
        - Curar puntos de sutura.
        - Vigilar presencia de signos de de infección en herida.
        - Retirarlos cuan do se tenga seguridad (10-12 días).
        - Dejar la zona al aire.
        - Registrar la cura de herida en la historia
    - ➢ **Catéter hickman**
      - Catéter central externo de
        Insertado con técnica tunelizada percutánea.
      - Catéter se sitúa
        - Vena canalizada subclavia o yugula
          - Salida subcutánea
      - Tratamiento
        - Limitados en tiempo.
        - Pacientes con mal acceso vascular periférico.
      - Implantación
        - Procedimiento médico-quirúrgico
      - **Descripción del dispositivo**
        - Catéter
          - Silicona, polietileno, radiopaco
        - Manguito de Dacron
          - Fijar el catéter al tejido subcutáneo.
          - Actuar de barrera antibacteriana.
        - Clamps y vainas de protección
        - Conexiones luer
          - Rojo.
          - Blanco.
          - Azul
    - ➢ **Catéter PICC**
      - Catéter central de inserción periférica
        - No tunelizado
      - Se utiliza en pacientes
        - Buen acceso venoso periférico.
        - Tratamientos limitados en tiempo
      - Colocación
        - Técnica realizada
          - Enfermeros/ as.
          - Coloca en vena cava superior.
          - Punción de una vena periférica, basílica ante cubital
      - **Tipos de PICC**
        - PICC central
          - Catéter alojado miembro superior
          - Vena cava inferior si abordaje miembro inferior
        - PICC poliuretano
          - Grado 3, 1 o 2 luces
            - Duración intermedia
        - PICC silicona
          - 1 o 2 luces
            - Larga duración