



**NOMBRE DEL ALUMNO: MIGUEL IVAN
VÁZQUEZ MONTEJO**

TRABAJO: mapa mental

MATERIA: ENFERMERIA DEL adulto

NOMBRE DEL DOCENTE. Lic. Erika cedillo

GRADO: sexto Cuatrimestre

Mental oxigeno terapia


INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA

Su acción comienza a la 1/2 hora

-Máximo efecto: 1-3 horas

-Su efecto dura entre 6-8 horas

-Inyectarla 30 minutos antes de comidas



ANÁLOGO DE INSULINA DE ACCIÓN ULTRARRÁPIDA

Su acción comienza a los 10-20 minutos, Máximo efecto 1-2 horas, Fin de efecto 3-5 horas, Inyectar 10 minutos antes de

comidas.



INSULINA ACCIÓN INTERMEDIA


Comienzo de acción: 1-2 horas, Máximo efecto: 4-6 horas, Su efecto dura entre 10-12 h, Utilizan Zn o protamina como retardante, Inyectar 30 minutos antes comidas, se utiliza como insulina basal cuando se inyecta dos veces al día o en



Insulina

Es una hormona

Acción concertada de varias hormonas generadoras de hiperglicemia y para mantener bajos los niveles de glucosa en sangre





Oxigenoterapia hiperbárica

Oxigenoterapia normobárica

Administra oxígeno

Oxigenoterapia

terapia respiratoria

Mascarilla venturi

vías

Mascarilla simple.

Cánulas nasales.

Mayor FiO₂

Mascarilla reservorio

Cánula nasal de AF

Ventimask

Mascarilla simple

Menor FiO₂

Gafas nasales



os que les llevamos seguimiento a sus pacientes, tanto con las pruebas respiratorias