



**Nombre de alumnos:**

Jesús López Gómez.

**Nombre del profesor:**

Enfermera. Erika Cedillo

**Nombre del trabajo:**

**Materia:**

Enfermería del Adulto.

**Grado:**

**Grupo:**

Si se presenta un traumatismo craneal grave


- Hemorragia craneal o facial severa
- Hemorragia o secreción de líquido de la nariz o los oídos
- Dolor de cabeza intenso
- Cambio en el nivel de conciencia por más de unos pocos segundos
- Coloración azul y negra debajo de los ojos o detrás de las orejas
- Apnea
- Confusión
- Pérdida de equilibrio
- Debilidad o incapacidad para usar un brazo o una pierna
- Pupilas de tamaño desigual
- Balbuceo
- Convulsiones

Siguientes signos o síntomas

La mayoría de los traumatismos craneales involucran lesiones que son menores y no requieren atención especializada u hospitalización.

## Traumatismo.

Mantén a la persona inmóvil.



Detén cualquier hemorragia

Aplica presión firme sobre la herida con una gasa estéril o un paño limpio. Pero no apliques presión directa sobre la herida si sospechas de una fractura de cráneo.

Está atento a los cambios en la respiración y la lucidez mental.

Si la persona no muestra signos de circulación (falta de respiración, tos o movimiento), comienza la reanimación cardiopulmonar.

### Exploración general

1. Ventilación adecuada.
2. Intubación de pacientes.
3. Reanimación cardiovascular
4. Evaluación de heridas.



Un traumatismo craneal abierto o penetrante significa que usted fue golpeado con un objeto que rompió el cráneo e ingresó al cerebro


Un traumatismo craneal cerrado significa que usted recibió un impacto fuerte en la cabeza al golpear un objeto, pero el objeto no rompió el cráneo.

Es cualquier tipo de traumatismo en el cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. La lesión puede ser sólo un pequeño abultamiento en el cráneo o una lesión cerebral grave.

# Fractura de Cráneo.

Los traumatismos craneales incluyen:

Señales de una lesión de la cabeza



La conmoción cerebral, que es el tipo de lesión cerebral traumática más común

Heridas en el cuero cabelludo.

Fracturas del cráneo.

Causas

- Los accidentes laborales, en el hogar, al aire libre o al practicar deportes
- Las caídas
- La agresión física
- Los accidentes de tránsito

Síntomas

- Se torna muy somnolienta.
- Se comporta de manera anormal.
- Presenta dolor de cabeza fuerte o rigidez en el cuello.
- Tiene las pupilas (la parte central y oscura del ojo) de tamaños diferentes.
- Es incapaz de mover un brazo o una pierna.
- Pierde el conocimiento, incluso brevemente.
- Vomita más de una vez.

Valoración

1. Revise las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. De ser necesario, inicie la respiración boca a boca y RCP.

2.- Si la respiración y la frecuencia cardíaca son normales, pero la persona está inconsciente, trátela como si hubiera una lesión de columna. Estabilice la cabeza y el cuello colocando sus manos en ambos lados de la cabeza de la persona.

3.- Detenga cualquier sangrado, presionando firmemente con un pedazo de tela limpio sobre la herida. Si la lesión es grave, tenga cuidado de no mover la cabeza de la persona

Existen diferentes clasificaciones, según la funcionalidad, el tipo de materiales empleados, la complejidad técnica para su realización, etc., pero hemos preferido ésta en función de la solidez y permanencia de la inmovilización.

Sistemas inestables

Vendajes  
Ortesis

Sistemas semiestables

Sindactilia  
Férulas metálicas  
Férulas neumáticas  
Férulas de vacío  
Férulas de yeso

Sistemas rígidos

→ Yesos completos

