



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre del alumno LEYVI CHRISTIAN LOPEZ LOPEZ

Carrera ENFERMERIA

Materia practica clínica 1

Grado CUATRIMESTRE 6

Trabajo investigación diálisis e hemodialisis

Catedrática lic. Erika Cedillo reyez

Definición Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos, debido a la acción de diversos agentes físicos (llamas, líquidos u objetos calientes, radiación, corriente eléctrica, frío), químicos (cáusticos) y biológicos

Las causas principales de muerte en el paciente quemado, en etapa temprana son el shock hipovolémico y compromiso agudo respiratorio originado por inhalación de humo

Paciente gran quemado


El manejo inicial del paciente quemado es el de un paciente de trauma mediante el ABC GRADO DE RECOMENDACION C La reposición de volumen en las primeras 24 hrs debe realizarse con Ringer Lactato calculando requerimientos mediante la fórmula de Parkland, y con monitoreo estricto de diuresis. Debe proveerse nutrición adecuada en forma precoz, privilegiando la vía de nutrición enteral cada vez que sea posible. GRADO DE RECOMENDACION A No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos en estos pacientes. GRADO DE RECOMENDACION A

Gran quemado: El paciente gran quemado es aquel que cumple con alguno de los siguiente criterios: • Con un índice de gravedad >70 puntos o con quemaduras AB o B > 20% de SC (Ver cuadro 1) • > 65 años con 10% o más de quemadura AB o B (ver cuadro 2) • Con quemaduras respiratorias/por inhalación de humo • Con quemaduras eléctricas por alta tensión • Quemados politraumatizados • Quemados con patologías graves asociadas

En el diagnóstico del paciente quemado se debe considerar: • La extensión de las quemaduras, mediante regla de los 9 en adultos, y la gráfica de Lund y Browder en niños. • La profundidad de las quemaduras, mediante la clasificaciones de Benaïm, ConverseSmith, o ABA • La localización de las quemaduras, considerando las áreas funcionales o estéticamente especiales • La edad del paciente (extremos de la vida) • La gravedad, según índices de Garces (adultos), Garcés modificado por Artigas (2 a 20 (< 2 años). Se consideran graves los pacientes con índice > 70, o con:

Curación

La curación inicial incluye el retiro de tejido desvitalizado, flictenas y otros contaminantes, lavado con suero fisiológico, Escarotomía o Fasciotomía, desbridamiento compartimentos musculares cuando está indicado, y finalmente cobertura (excepto cara y periné). GRADO DE RECOMENDACION B



Las quemaduras de primer **grado** afectan solo la capa externa de la piel. Causan dolor, enrojecimiento e hinchazón.

Las quemaduras de segundo **grado** afectan ambas, la capa externa y la capa subyacente de la piel. ...

Las quemaduras de tercer **grado** afectan las capas profundas de la piel

