



Candelaria Elizabeth González Gómez



Dra. Claudia Gpe. Figueroa López

Trabajo de parto

Comitán de Domínguez, Chiapas a 30 de julio de 2020.

Trabajo de parto

¿QUÉ ES?

Consiste en una serie de **contracciones uterinas** rítmicas y progresivas que **gradualmente hacen descender al feto por el cérvix** (cuello del útero) y la **vagina** (canal del parto) **hacia el exterior**.



COMIENZO DEL PARTO

- ✓ **Contracciones** (2 o más con 30 s de duración, en 10 min)
- ✓ **Dolor de espalda**
- ✓ **Expulsión del tapón mucoso** (desde la expulsión del tapón mucoso hasta el comienzo de las contracciones pueden pasar hasta 72 horas)
- ✓ **Rotura prematura del saco amniótico** (ponerse en contacto con el médico de inmediato)

FASES DEL PARTO

Conjunto de **fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión por vía vaginal del feto de 22 de semanas o más de gestación**, incluyendo **placenta y anexos**.

Primera fase

- Periodo de dilatación y borramiento del cuello uterino
- Permite que el feto pase a la vagina
- Cuenta con dos fases:
 - ✓ **Fase inicial o latente: contracciones irregulares** al principio, pero cada vez más fuertes y rítmicas, molestias mínimas, cuello uterino más delgado y se dilata aproximadamente 4cm; esta fase tiene una duración media de 8h (no más de 20h) en **nulíparas** y de 5h (no más de 12h) en **multíparas**.
 - ✓ **Fase activa: contracciones regulares**, dilatación progresiva a partir de 4cm; esta fase dura de 7-18h media en un **nulíparas** y de 5-12h en **multíparas**.


Etapa 2




Tercera fase

- Periodo de **alumbramiento**
- **Expulsión de la placenta**
Desde el pinzamiento del cordón umbilical del recién nacido hasta la expulsión de la placenta
- **Duración promedio: 30min.**


Fase Inicial (Latente) Etapa 1



Fase Activa



Fase de Transición



Segunda fase

- Periodo de **expulsión**
- Comienza con la dilatación completa y termina con la expulsión del feto
- **Duración promedio: 60min – 2h** (analgesia en nulíparas), 60min (multíparas sin analgesia) y 2h (analgesia multíparas).

Etapa 3

