



Nombre del Alumno: Andrea Caballero Navarro

Nombre del Profesor: Dra. Claudia Gpe Figueroa
López

Nombre del trabajo: Súper Nota, Etapas del trabajo
de parto

Materia: Morfología y Función

Grado y grupo: 3°A

Etapas del parto


Etapa Uno: Dilatación

Esta etapa se define en el inicio del parto desde la dilatación, borramiento, contracciones y la progresión misma de la dilatación y contracciones

La etapa uno se divide en dos fases:

- Fase latente: se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración, y se acompaña de borramiento cervical y progresión lenta de la dilatación hasta los 2 o 4 cm.

• Fase Activa: se caracteriza por el aumento en la regularidad, intensidad y frecuencia de las contracciones y la rápida progresión de la dilatación



1. Útero sin borramiento ni dilatación

2. Cuello del útero borrado y dilatado a 1 cm

3. Cuello del útero dilatado a 5 cm

4. Cuello del útero dilatado por completo a 10 cm

La mayoría de las mujeres nulíparas alcanza la segunda etapa del parto dentro de las primeras 18 horas y las multíparas en 12 horas sin intervenciones

En el parto las contracciones de Braxton Hicks aumentan en intensidad y en frecuencia pero no llegan a ser cada 3 minutos.

En las contracciones uterinas hay gran parte de los músculos uterinos haciendo contracciones.

Cuando las contracciones llegan a ser más incidentes empieza la segunda etapa.



Etapa Dos: Expulsión

Es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal.

A su vez se subdivide en dos fases:

1

Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo.

La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta 2 horas tanto si tienen como no anestesia epidural.

La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora si no tienen anestesia epidural y de 2 horas si la tienen.



¡YA SE VE LA CABEZA DEL BEBÉ!



2

Periodo expulsivo activo: cuando, el feto es visible o existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa o pujos maternos en presencia de dilatación completa con ausencia de contracciones de expulsivo.

La duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen anestesia epidural y de hasta 2 horas si la tienen.

La duración normal de la fase activa de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora tanto si tienen como no anestesia epidural.




¡¡LISTOS PARA LA EXPULSIÓN!!

Etapa Tres: Alumbramiento

Es la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta.

La duración de la tercera etapa del parto se considera prolongada si no se completa en los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato con manejo activo y 60 minutos con el alumbramiento espontáneo



COMPLICACIONES

Una duración superior a los 30 minutos tras un manejo activo del alumbramiento, se asocia con un incremento en la incidencia de hemorragias posparto

Retención placentaria

Inversión uterina

Síndrome de Sheehan



Cara materna con sus respectivos 15 a 20 cotilodones

Cara fetal con sus venas y arterias en espirales

Bibliografía

- ◇ Ministerio de sanidad y política social, 2015, Guía practica clínica sobre la atención del parto normal. PDF. Recuperado el 30 de julio de 2020. URL: <file:///C:/Users/Usu/Desktop/UDS-ANDREA/3er%20cuatri/Morfologia%20y%20Funcion/PDF/Parto%20Normal.pdf>