

PRESENTA EL ALUMNO: Juana Beatriz Francisco Francisco

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUATRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE: Felipe Antonio Morales Hernández

MATERIA : Enfermería Gerontogeriatrica

Trabajo: Cuadro sinóptico "TEMA 1.7 Y 1.8"

FECHA: 21/05/2020

Incontinencia

urinaria

Definición {

- Cualquier pérdida involuntaria de orina ocurrida en al menos seis ocasiones durante el año o cualquier historia evidente de goteo inducido por estrés o urgencia
- Problema fisiológico, es considerada un problema social e higiénico.

}

Gravedad {

- Leve** { Fuga de escasas gotas de orina algunos días al mes
- Moderada** { Fuga diaria de gotas de orina.
- Severa** { Pérdida de mayores cantidades de orina al menos una vez por semana

}

Incontinencia urinaria aguda { Inicio súbito de fuga de orina que puede ocurrir durante delirio, infección aguda, inmovilidad, movilidad restringida, retención urinaria con desbordamiento, impactación fecal e inicio reciente de ingesta de fármacos como 31 diuréticos, tricíclicos o psicotrópicos.

Etiología { Habitualmente multifactorial. Factores físicos, cognitivos, funcionales y psicosociales como constipación, medicamentos, hospitalización, delirio, cirugía genitourinaria, enuresis en la infancia y enfermedad cardiovascular

Incontinencia urinaria de esfuerzo { Pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal { Toser, reír, correr, andar

Incontinencia urinaria de urgencia { Pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida de urgencia

Incontinencia urinaria mixta { Percepción de pérdida involuntaria de orina asociada tanto a urgencia como al esfuerzo

Incontinencia urinaria continua { Pérdida involuntaria y continua de orina. Puede ser debida a una fístula, desembocadura ectópica ureteral o a un déficit intrínseco uretral grave

Enuresis nocturna { Pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Incontinencia urinaria inconsciente

Incontinencia urinaria inconsciente { Pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal

C A I D A S

Definición

Cuando una persona aparece en el suelo o en un nivel inferior; en ocasiones, una parte del cuerpo golpea contra un objeto que interrumpe la caída

Generalidades

- Todos los años, entre el 30 y el 40% de las personas ancianas que viven en la comunidad y el 50% de los que viven en hogares experimentan caídas.
- Las caídas ponen en riesgo la independencia de los ancianos y causan una cascada de consecuencias individuales y socioeconómicas

Etiología

Factores intrínsecos

Deterioro de la función relacionado con la edad, trastornos y efectos adversos de fármacos

- La agudeza visual
- Las enfermedades crónicas y agudas
- Uso de fármacos

Factores extrínsecos

Riesgos ambientales

El riesgo es máximo cuando las condiciones del medio requieren un mayor control postural y del y cuando el entorno no resulta familiar.

Factores situacionales

Relacionados con la actividad que realiza el paciente.

- Caminar y hablar simultáneamente o distraerse con múltiples tareas concurrentes y no poder prestar atención a los riesgos del ambiente

., El final del camino o de un escalón

- Correr al baño

- En especial durante la noche
- Individuo no está bien despierto
- Iluminación puede no ser adecuada

- Apurarse para atender el teléfono

Complicaciones

- Las caídas, en particular las repetidas, aumentan el riesgo de lesiones, hospitalizaciones y muertes
- Sobre todo en ancianos debilitados, con enfermedades preexistentes (p. Ej., Osteoporosis)
- dificultades para realizar las actividades de la vida cotidiana (p. Ej., Incontinencia).
- 50% de las caídas que suceden en ancianos provocan lesiones
- Se informa que las caídas contribuyen con más del 40% de los ingresos en los asilos

Bibliografía

- ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA. Licenciatura en Enfermería Generalidades de geriatría.