



Yamile Yenitzi Pérez Vázquez

Felipe Antonio Morales Hernández

Super nota

Enfermería gerontogeriatrica

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: "A"

PROBLEMAS GERIÁTRICOS DE MAYOR REPERCUSIÓN

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL ANCIANO CON PROBLEMAS OSTEOARTICULARES

OSTEOPOROSIS: es una enfermedad metabólica ósea crónica y progresiva que puede afectar a todo el esqueleto.

prevalencia es especialmente elevada en mujeres posmenopáusicas y que sin la intervención adecuada

OSTEOPOROSIS POSMENOPÁUSICA

- + Mujeres de 50 a 70 años
- + Pérdida de hueso tubercular
- + Fracturas más frecuentes
- + Fractura de tercio distal de radio y cubito



PATOGENIA: El esqueleto está compuesto por hueso cortical, una capa externa compactada y densa y hueso trabecular, una capa interna con aspecto de panal

Medios diagnósticos de la osteoporosis:

NANDA: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C inmovilidad física.

- + NOC Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101).
- + NIC Prevención de las úlceras por presión 3540.
- + Registrar el estado de la piel a diario.

OSTEOPOROSIS SENIL

- + Inicia después de 70 años
- + Afecta a ambos sexos
- + Pérdida de hueso trabecular y cortical


**CUIDADOS DE ENFERMERÍA
AL ANCIANO CON
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS**



EL FALLO RESPIRATORIO AGUDO:
implica la imposibilidad de mantener una captación normal de oxígeno por los tejidos o una eliminación del anhídrido carbónico por los mismos.



Adulto en estado crítico



EVALUACIÓN INICIAL A LA LLEGADA:

- + Recepción, Acogida y Clasificación del paciente y paso al box de críticos si procede según la Escala Canadiense.
- + Inicio del circuito de atención rápida: Aviso al médico responsable, y aplicación inmediata del ABC del soporte vital avanzado
- + Actividades de enfermería
- + Cuidados de comunicación: Apoyo emocional. Informar inicialmente al paciente
- + Registro de acciones y actividades.



- + Desde hace 30 años
- + Como soporte respiratorio con pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.



- + Desde hace 70 años
- + La disminución de la morbi-mortalidad
- + La menor tasa de intubación orotraqueal.