

PRESENTA EL ALUMNO: Marlinda Mayrandi Alfaro Mazariegos

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to. CUATRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO



DOCENTE: Maria Cecilia Zamorano Rodriguez

MATERIA: Enfermeria Quirurgica II

TRABAJO: Mapa conceptual

FECHA: 22 de mayo del 2020

Cuidados de enfermería al paciente con alteraciones gástricas.

Proceso del enfermero

- 1. Valoración
- 2. Diagnóstico
- 3. Planificación
- 4. Ejecución
- 5. Evaluación

Local-Regional

El Post Operario inmediato

La enfermera

Señal

Es un periodo crítico

Pueden

sobrevivir complicaciones.

Pero

algunas de ellas son prevenibles.

Capaz de identificar la respuesta del enfermo

lo más importante

es

la evaluación

Bajo anestesia general.

Un proceso quirúrgico

Sedación

# 1.12: Alteraciones Intestinales

Coloproctología

o También llamada:

Proctología

Es la especialidad de la medicina.

Brinda

Diagnóstica

Tx Quirúrgico:

Enfermedades Tratadas por un Coloproctólogo

Hemorroides

Incontinencia Fecal

Estreñimiento

Tumores del colon y ano

Cáncer de colon y Recto

Adivulo

Angiodisplasias de colon

Lesiones rectoanales

# 1.13: Cuidados de enfermería a pacientes con problemas intestinales

Cuando esta en el hospital

Antes y Después de la cirugía

◦ Adm de líquidos

◦ Adm de medicamentos

◦ Sonda gástrico-intestinal

Complicaciones en el hogar

◦ Dolor al toser

◦ Dolor al estornudar

◦ Puede tener diarrea

Problemas con su caloriforma.

Cuidado de la Herida:

Mantener la herida seca

Cambiar opósito con frecuencia


Lavar la herida

-con

Agua

Jabón

Dorimente



# 1.15 - Cuidados de enfermería con Problemas Hepatobiliares

Consideraciones Previas:

Antecedentes Patológicos

Complicaciones Postoperatorias

Dolor

Hemorragia

Infección en el sitio Quirúrgico

Cuidados Postoperatorios

Inmediato

Se reanuda habitualmente en URPA

Medicatio

El objetivo es mantener la autonomía del paciente

Comprobar si el px realiza infección espontánea

Cuidados de la Herida

Curación con Sero Fisiológico

Después de las 48 hrs no es necesario cubrir la Herida

Vigilar Posibles Signos de Infección

