



Diego Solorzano Deleón

Cuadro sinoptico

**Materia: Enfermería medico
quirúrgica.**

PASIÓN POR EDUCAR

Grado y grupo: 6A

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de junio 2020

2.7 cuidados de enfermería a pacientes sometidos de cirugía renal.

¿en que consiste?

Se administra anestesia general. se le introduce al quirófano, normalmente la cirugía dura de 3 a 5 horas.

Plan de acciones

- valorar nivel de conciencia
- conectar y asegurar drenajes.
- observar signo de sangría miénto en herida.
- toma de signos vitales

- observar signos de shock.
- Medir diuresis horaria
- Balance hidromineral
- Reposo en cama

Plan de cuidados

- Determinar nivel de disconfort
- cambiar al paciente de posición
- Mantener buena alimentación
- Evaluar pulso
- Examina MI
- Evaluar color
- Masajea y protege prominencias óseas.

Otros cuidados

- Monitorear nivel de proteínas
- Valorar ruidos
- Ambiente agradable
- Animar al paciente
- Evaluar necesidades.

2.8 Infecciones urinarias

¿qué es?

La infección del tracto urinario es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patológicos en el tracto urinario.

sin presencia de síntomas. Hasta que la patología avanzada presenta síntomas.

Area propensa

Las mujeres son más propensas que los hombres.

síntomas

Las infecciones de las vías urinarias no siempre causan signos y síntomas.

- Necesidad imperiosa y constante de orinar.
- Sensación de ardor al orinar.
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades.
- Orina de aspecto turbio.
- Orina con olor fuerte.
- Dolor pélvico.

Diagnóstico

- EGO.
- Cultivo de bacterias.
- Endos copia.
- Ultrasonido.

2.9 cuidados de enfermería en las infecciones crónicas.

Objetivo

La enfermera crítica tiene como principal objetivo la realización de manejo de muestras de orina, además de pinzas y recetar la banda Foley.

Es importante seleccionar en forma empírica hasta que se encuentre o realiza un cultivo y antibiograma o un antibiótico de alta eficiencia.

Antibiótico

Cuando se elige un beta-lactámico el éxito terapéutico depende del tiempo en que la concentración del antimicrobiano permanece por encima de la concentración

El fracaso terapéutico con un beta-lactámico se debe a que ha sido administrado mal.

ITo no complicada

Se ha usado como antibiótico la trimetoprim-sulfametoxazol, pero estudios recientes demuestran que su susceptibilidad es baja.

2.10 alteraciones
proliferativas que
requieren cirugía
urológica.

Enfermedades
frecuentes.

- Hiperplasia Benigna de Prostata.
- Cáncer de Prostata
- Prostatitis.

Es importante
realizar un correcto
diagnóstico diferencial
para indicar el
tratamiento.

Prostatitis

Es una inflamación
de la Prostata producida
habitualmente por una
infección bacteriana.
Es muy frecuente y
afecta al 15 y 20% de
los hombres.

- Prostatitis bacteriana
Aguda.
- Prostatitis bacteriana
crónica.

Hiperplasia benigna
de Prostata.

La glándula prostática
tiende a crecer con
la edad y a partir
de los 40-45 años
- comprime la uretra.