

Nombre de alumnos: Sandy Yamileth Villatoro Alvarado

**Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano
Rodríguez**

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Enfermería Medico Quirúrgica II

Grado: 6 Grupo: "A"

2.7 Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de cirugía renal.

Cirugía Renal

Consiste en extraer uno de sus riñones. (Nefrectomía)

Duración:

Dura aproximadamente 3 a 5 hrs.

Se podrá realizar la cirugía mediante:

Laparoscopia o abierta

Cuidados

- Valorar nivel de conciencia
- Conectar y asegurar drenaje

- Observar signos de sangramiento en herida quirúrgica
- Toma de signos vitales

- Observar signos de shock
- Medir diuresis horaria

- Llevar balance hidromineral
- Reposo

Cuidados

- Determinar nivel de discomfort
- Cambiar al paciente cada 2 hrs.

- Mantener buena alineación corporal
- Evaluar color y temperatura

- Mantener al paciente estimulado
- Asistir al paciente en el baño

- Ayudar al paciente con la higiene


Cuidados

- Brindar dieta doseada
- Valorar ruidos

- Brindar psicoterapia de apoyo
- Proveer medicamentos

- Colocar posición adecuada
- Monitorear nivel de proteínas plasmáticas

2.8 Infecciones Urinarias



2.9 Cuidados de Enfermería en Infecciones Urinarias.

En los cuidados de enfermería deben determinar si es causada por virus o bacteria

se establecerá una medición adecuada que tendrán que controlar

son también básicas medidas de higiene.

Algunos síntomas que presentan son:

- Picazón o quemazón en la uretra al orinar
- Dolor al orinar

- Entorpecimiento en la vía al orinar
- Aparición de sangre

Necesidad frecuente de orinar.

Cuidados de Enfermería:

- Control de signos vitales
- Orientar correctamente la técnica para la recolección de muestra de orina

• Explicar la importancia del cumplimiento de la dieta e ingestión de abundantes líquidos

- Administración de medicamentos

• Realizar cateterismo vesical si está indicado en caso de anuria.

Cuidados de enfermería:

- Mantener Reposo en cama
- Dieta adecuada para evitar el estreñimiento
- Mantener vía heparinizada permeable.

• Educar sobre la higiene personal, limpieza y uso de ropa de algodón

2.10 Alteraciones urológicas que requieren cirugía urológica

Prostatitis

Es una inflamación de la próstata producida por una infección bacteriana

Es muy frecuente y afecta del 15 al 20 % de los hombres

En algunos momentos de su vida.

Tipos

Bacteriana Aguda:

Cursa con fiebre alta, intensas molestias miccionales y dificultad para orinar.

Bacteriana Crónica

Suele cursar con episodios repentinos de infección urinaria.

Cáncer de próstata

Se desarrolla en la zona periférica de la próstata y habitualmente sin síntomas

Cuando el cáncer de próstata se ha extendido fuera de la próstata, en los huesos

Produce: dolor óseo

hiperplasia benigna

Es un crecimiento de la parte central de la próstata

Puede desarrollar un cáncer prostático

Tratamiento:

Disponen de medicamentos y cirugías que pueden aliviar y mejorar los síntomas

Esto depende de la clínica que presente el paciente.

Hiperplasia Benigna de Próstata

Los pacientes con síntomas leves no precisan un tratamiento

4 tipos de medicamentos para tratar la HBP:

- Extractos de pluma
- Alfa-bloqueantes
- tadalafil 5mg
- Inhaladores

(Antología)

Bibliografía

Antología. (s.f.). *Enfermería medico Quirurgica II*. Págs: 98-110.