

PRESENTA EL ALUMNO:

Liliana López López

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to CUTRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN ENFERMERIA
ESCOLARIZADO

DOCENTE:

Zamora Rodriguez Maria Cecilia

**MATERIA : ENFERMERIA MEDICO
QUIRURGICA II**

TRABAJO: Cuadro sinoptico.

FECHA DE ENTREGA: 17/06/2020

2.7

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES INT-FRENIDOS DE CIRUGIA RENAL.

PLAN DE ACCIONES O CUIDADOS

- VALORAR EL NIVEL DE CONCIENCIA.
- CONECTAR Y ASEGURAR DRENAJE.
- OBSERVAR SIGNOS DE SANGRAMIENTO.
- TOMAR SIGNOS VITALES.
- MEDIR DIURESIS HORARIA.
- LLEVAR BALANCE HIDROMINERAL.

VIGILAR

- * SIGNOS
- * SINTOMAS
- * REPOSO.
- * PSICOTERIA
- * ASEPSIA
- * ANTISEPSIA.

BRINDAR OLETA DESEADA POR EL PACIENTE Y CON TEMPERATURA ADECUADA.

- MONITOREAR EL NIVEL DE PROTEINA.
- VALORAR RUIDOS.
- AMBIENTE AGRADEABLE.

- PROMOVER DEAMBULACION PRECOZ.
- LIMITAR CONTACTO CON PERSONAS AJENAS

ACCIONES INDEPENDIENTES

- EXPLICAR NECESIDAD DE INGESTA EQUILIBRADA DE NUTRIENTES.
- AYUDAR AL PACIENTE A IDENTIFICAR SU RESO DESEADO.
- TENER EN CUENTA EL RESO IDEAL.
- VALORAR LOS SIGNOS DE SANGRAMIENTO INTERNO O EXTERNO.
- COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION ADECUADA.
- PREVENIR COMPLICACIONES.

2.8

INFECCIONES URINARIAS

ES CONSIDERADA GENERALMENTE COMO LA EXISTENCIA DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN EL TRACTO URINARIO CON O SIN PRESENCIA DE SINTOMAS.

ORIGEN BACTERIANO

80-90%

EN ESTE CASO LA DESINFECCIÓN EXACTA EXIGE NO SOLO LA PRESENCIA DE GERMENES EN LAS VIAS URINARIAS.

CONTEOS DE UFC POR DEBAJO DEL NIVEL.

HOMBRES

MAIOR PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN.

ETIOLOGIA

LAS INFECCIONES MAS IMPORTANTES DEL SER HUMANO

ITU

PROBLEMA DE SALUD QUE AFECTA A MILLONES DE PERSONAS CADA AÑO.

CRITERIA

SE QUEDA COMO LA CAUSA DE INFECCIÓN MAS FRECUENTE.

ITU CLASIFICADA:

ALTA: PRESENCIA DE SIGNOS Y SINTOMAS DE ITU BAJA ASOCIADA A COLORIZACIÓN.

LA PRES EN EL TIENE ELEVAC

BAJA: COLOCACIÓN BACTERIANA A NIVEL DE URETRA Y VESIGA QUE NORMALMENTE SE ASOCIA A LA PRESENCIA DE SINTOMAS

NO COMPLICADA:

LA QUE OCURRE EN PACIENTES QUE Tienen UN TRACTO URINARIO NORMAL.

EL VA PARA DE

COMPLICADA:

FACTORES ANATOMICOS.

0%. EN ESTE CASO LA DESINFECCIÓN EXACTA EXIGE NO SOLO LA PRESENCIA DE GERMENES EN LAS VIAS URINARIAS.

OMBRES { MAYOR PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN.

ITU { PROBLEMA DE SALUD QUE AFECTA A MILLONES DE PERSONAS CADA AÑO.

DE SIGNOS Y SINTOMAS ASOCIADA A COLORIZACIÓN.

ACTERIANA A NIVEL DE GUA QUE NORMAMENTE PRESENCIA DE SINTOMAS

EN PACIENTES QUE TRACTO URINARIO

UATOMICOS.

ETIOLOGIA

MÁS DE 95% DE LOS CASOS, UN ÚNICO MICROORGANISMO ES EL RESPONSABLE DE LA ITU.

EL AGENTE ETIOLÓGICO MÁS FRECUENTE DE ITU EN AMBOS SEXOS.

CRITERIOS

PRESENCIA DE UNO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS,

> 38°C FIEBRE

≥ 10⁵ UFC/ML ORINA.

CON NO MÁS DE DOS ESPECIES EN EL ORGANISMO.

LA PRESENCIA DE PIURIA EN EL ANÁLISIS URINARIO TIENE UNA SENSIBILIDAD ELEVADA (95%).

PRUEBA

UROCULTIVO.

EL VALOR PREDICTO POSITIVO PARA UNA CONCENTRACIÓN DE 10² UFC/ML ES 88%.

EN VISTA DE ESTO LOS CLÍNICOS Y LOS MICROBIÓLOGOS DEBEN CABBIAJ SU PERSPECTIVA.

2.9

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES URINARIAS.

Muestras de orina,

Sonda Foley { 12-24 horas.

El tratamiento de la ITU depende si es complicada o no complicada y siempre se debe tener en cuenta, a los factores de riesgo.

Objetivos { Deben ser la obtención de respuesta rápida, y efectiva, prevención de la recurrencia y evitar la aparición de resistencia a los antibióticos.

Antibiótico { beta-lactámico.

Depende de tiempo en el que la concentración del antimicrobiano permanece por encima de la concentración inhibitoria mínima.

ITU no complicada:

Se usará de rutina trimetoprim-sulfametoxazol.

La bacteriuria { Debe ser tratada con antibióticos.

PACIENTE INCAPAZ DE TOLERAR LA MEDICACIÓN { - TERAPIA EMPÍRICA
- ANTISEUDOMONAS

2-10

ALTERACIONES UROLOGICAS QUE REDUCEN CIRUGIA UROLOGIA.

→ HIPERPLASIA BENIGNA.

→ CANCER DE PROSTATA.

→ PROSTATITIS CRONICA.

DOLORES PELVICOS CRONICOS

CANCER DE PROSTATA

EL CRECIMIENTO ES BENIGNO O MALIGNO.

REVISIÓN

GLANDULA PROSTATICA TIENDE A CRECER CON LA EDAD Y A PARTIR DE LOS 40-45 AÑOS.

HBP - PUEDE COMPRIMIR LA URETRA Y ES LA RESPONSABLE DE LA APARICION DE SINTOMAS URINARIOS.

INFLAMACION PRODUCIDA HABITUALMENTE POR UNA INFECCION BACTERIANA.

AGUDA
CRONICA

INFLAMATORIO

NO INFLAMATORIO.

CRECIMIENTO MALIGNO DENTRO DE LA PROSTATA SIN SINTOMAS CLINICOS.

- HABITUALMENTE NO PRODUCE SINTOMAS.

CRECIMIENTO MALIGNO
CANCER

VARÓN > 45 AÑOS / UNA VEZ AL AÑO.