



PASIÓN POR EDUCAR

PRESENTA EL ALUMNO:

Carla Yazmin Hernández Espinoza

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to. CUATRIMESTRE "A" LICENCIATURA EN
ENFERMERIA ESCOLARIZADO

NOMBRE DEL PROFESOR:

María Cecilia Zamorano Rodríguez

NOMBRE DEL TRABAJO:

Cuadro sinóptico

MATERIA:

Enfermería Medico Quirúrgica

FECHA:

18 De junio de 2020

2.7
Cuidados de Enfermería a Pacientes Interventidos de Cirugía Renal

En que consiste la Operación

Con solo cuidado se extraera uno de los riñones y se le trasplantara al receptor La cirugía dura de 3 a 5 horas.

Plan de cuidados acciones independ.

- Valorar nivel de conciencia
- Conectar y asegurar drenajes
- Toma de signos vitales
- Medir diuresis horaria
- Observar signos de shock
- Mantener higiene corporal

- Garantizar reposo
- Mantener vías aéreas permeables
- Reposo en cama
- Psicofarmacología de apoyo
- Asepsia y antisepsia

Acciones Independientes

- Determinar nivel de discomfort
- Cambiar al paciente de posición
- Mantener alineación corporal
- Evaluar pausas
- Evaluar color y temperatura MI

- Realizar ejercicios activos
- Promover medidas de confort
- Promover orientación
- Evitar ropas excesivos
- Mantener paciente estimulado

Acciones Independientes

- Brindar dieta descaida
- Valorar ruidos
- Brindar ambiente agradable
- Monitorear nivel de proteína
- Evaluar necesidad de aprendizaje
- Limitar contacto con persona ajena

- Deconvulsión precoz
- Mantener sistemas invasivos cerrados
- Valorar signos de sangrado
- Ayudar al paciente a identificar peso deseado
- No brindar falsas expectativas

Infecciones
Orinarias

Que es

Es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

Incidencia

Se estima que globalmente ocurren al menos 150 millones de casos de IU por año, el 25 al 30% desarrollan infecciones recurrentes.

Criterios
Diagnósticos

- Fiebre mayor a 38 (tensión) poliquipuria, disuria dolor suprapúbico
- Nitritos de leucocitos - Esterasa positivo Prueba.

Etiología

El 95% de los casos en ambos sexos es la Escherichia coli responsable del 75 al 80% de casos el 20 y 25% restante incluye microorganismos como: Staphylococcus.

La enfermera tiene como principal objetivo la realización de mando de muestras de orina además de pinzar y recolectar de la sonda de Foley si esta está instalada

Cuidados de enfermería.

La elección de antibiótico, en diversas infecciones depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico.

2.9

Cuidados de Enfermería en las Infecciones Urinarias.

En caso de la ITU, lo importante es la concentración del antibiótico en el parénquima renal y en la capa más profunda de la pared de la vejiga y de la próstata

La excreción, concentración urinaria y determinación de la actividad del antibiótico en la orina son importantes para la decisión del tratamiento

ITU Complicada:

Se prefiere usar macrolidina, Cefalosporinas de primera y segunda generación

Enfermedades que se desarrollan en Prostata.

- Hiperplasia benigna de Prostata
- Cáncer de prostata
- Prostatitis.

2-10

Alteraciones
Urológicas que
requieren
Cirugía Urológica

Prostatitis

Inflamación de la prostata producida habitualmente por una infección bacteriana.

Tipos

- Prostatitis bacteriana aguda
- Prostatitis bacteriana crónica
- Prostatitis inflamatoria asintomática.

Hiperplasia
benigna de
Prostata

La glándula prostática tiende a crecer en la zona transicional que rodea la uretra. Este crecimiento es muy variable de unos hombres a otros.

Cáncer de
prostata

El cáncer de prostata es el tumor más frecuente en el hombre, es un crecimiento maligno dentro de la prostata.

Se desarrolla en la zona periférica y no produce síntomas habitualmente.

Solo 10 presentan uno de cada nueve varones.

