



**Nombre de alumno: DIANA  
GUADALUPE GARCIA ESPINO**

**Nombre del profesor: MARIA CECILIA  
ZAMORANO RODRIGUEZ**

**Nombre del trabajo: CUADROS  
SINOPTICOS**

**Materia: EFERMERIA MEDICO  
QUIRURGICA**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 6to CUATRIMESTRE**

**Grupo: "A"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de junio de 2020.

2.7  
Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de cirugía renal.

En que consiste la operación.

Se administra anestesia general en el quirófano.

Plan de acciones o cuidados

- Valorar el nivel de conciencia
- Conectar y asegurar drenajes
- Toma de signos y síntomas
- Medir diuresis horaria
- Reposo en agua

Acciones independientes

- Valorar ruidos
- Monitorear nivel de proteínas
- Brindar ambiente agradable
- Explicar necesidad de ingesta equilibrada de nutrientes

Plan de acciones

- Determinar nivel de discomfort
- Cambiar al paciente de posición c/2h
- Mantener buena alineación corporal
- Evaluar pulsos (radial, pedal, tibial) etc.
- Examinar MI (edemas, várices)
- Evaluar color y temperatura de MI
- Mantener al pac. estimulado (alerta y despierto) durante el día.

es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario.

## 2.8 Infecciones Urinarias

**infecciones ITO** } constituye un importante problema de salud que afecta a millones de personas cada año.

**clasi. ITO Baja** } colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga.

**clasi. ITO Alta** } colonización bacteriana a nivel uretral y del cuerno superior renal

**clasi. ITO complicada** } ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos

**2da clasi. ITO no complicada** } ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal.

**clasi. ITO o bacteria asintomática** } muchos pacientes pueden tener una bacteriemia significativa

**clasi. ITO recurrente** } más de 3 episodios de ITO demostrados por cultivo en un periodo de un año.

**clasi. ITO nosocomial** } aparición de infección urinaria a partir de los 48 hrs de la hospitalización.

2.9

Cuidados de enfermería en las infecciones urinarias

La enfermera tiene como principal objetivo la realización de manejo de muestras de orina.

Tratamiento de la ITU

depende si es complicada o no complicada, siempre se debe tener en cuenta los factores de riesgo.

Elección de un antibiótico

depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico

Cuando se elige un beta-lactámico

el éxito terapéutico depende del tiempo en que la concentración del antimicrobiano permanece por encima de la concentración.

En la ITU no complicada.

se ha usado de rutina trimetoprim sulfametoxazol

La bacteriuria asintomática debe ser tratada con antibióticos en los pt. sometidos a cirugía o manipulación urológica y trasplante renal.

## 2.10 Alteraciones Ciológicas que requieren cirugía Ciológica

3 enfermedades que se desarrollan más frecuentemente a partir de la próstata.

### enfermedades

- Hipertrofia benigna de próstata.
- Cáncer de próstata.
- Prostatitis.

### Tipos de Prostatitis

- Prostatitis bacteriana
- Prostatitis bacteriana crónica
- Síndrome de dolor pelviano
- Puede cursar con fiebre alta, intensas molestias miccionales.
- Puede cursar con episodios vegetales de infección urinaria.

### Síntomas irritativos

- Orinar con más frecuencia
- Levantarse por la noche.
- Cansancio, escape de orina.

### Síntomas obstrucivos.

- Disminución de la fuerza miccional
- Dificultad y necesidad de hacer fuerza para comenzar la micción.
- Golpe al terminar la micción.

### 2 tipos

- Crónico inflamatorio
- Crónico inflamatorio