



PRESENTA EL ALUMNO:

Carla Yazmin Hernández Espinoza

GRUPO, CUATRIMESTRE Y MODALIDAD:

6to. CUATRIMESTRE "A" LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA ESCOLARIZADO

DOCENTE:

Mahonrry De Jesús Ruiz Guillen

MATERIA:

Patología del adulto

TRABAJO:

Mapa conceptual: **ENFERMEDADES RENALES**

FECHA DE ENTREGA:

21 de junio de 2020



SINTOMAS

La principal sintomatología de la piel nefritis

- Escalofríos
- Fiebre
- dolor en la parte inferior de la espalda, en cualquiera de los dos costados (zonas lumbares),
- náuseas y vómito.

Aproximadamente un tercio de las personas que sufren infecciones del riñón tiene también síntomas de una infección de las vías urinarias inferiores, incluyendo micción frecuente y dolorosa.

PÍELO NEFRITIS.

Es una infección bacteriana de uno o ambos riñones. puede llevar a la sepsis y al fallo múltiple del órgano, la piel nefritis es una causa frecuente de formación de cicatrices en los riñones y puede llevar a la pérdida parcial de la función renal

La ITU suele comenzar en la uretra o la vejiga, y se extiende a los riñones.

DIAGNOSTICO

Pruebas complementarias habituales para determinar si los riñones están infectados

- el examen microscópico de una muestra de orina y el cultivo de bacterias para determinar cuáles están presentes.
- Las ecografías o las radiografías que se efectúan en estas situaciones pueden revelar la existencia de cálculos renales, alteraciones estructurales u otras causas de obstrucción urinaria.

TRATAMIENTO

- Debe iniciarse la administración de antibióticos tan pronto el diagnóstico de una infección renal parezca verosímil
- frecuentemente, requiere la hospitalización del paciente.

SINTOMAS

Se debe calificar a toda infección desde una perspectiva pronostica como:

- Complicada
- No complicada

La piel nefritis crónica puede producir un daño irreversible del riñón, llevando finalmente a insuficiencia renal crónica.

LITIASIS RENAL

SINTOMAS

Un cálculo renal puede no causar síntomas hasta que comienza a desplazarse por el riñón o hasta que pasa por el uréter

- Dolor intenso a los lados y en la parte posterior, debajo de las costillas
- Dolor que se extiende hacia la parte inferior del abdomen y hacia la ingle
- Dolor al orinar
- Hematuria.
- Infecciones de orina.

CUANDO CONSULTAR AL MEDICO

- Dolor acompañado por náuseas y vómitos
- Dolor acompañado por fiebre y escalofríos
- Sangre en la orina
- Dificultad para orinar

son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, Los cálculos renales tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga.

los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan.

CAUSAS

se producen cuando la cantidad de sustancias que forman cristales, como el calcio, el oxalato y el ácido úrico, en la orina es mayor de la que pueden diluir los líquidos presentes

FACTORES DE RIESGO

- Antecedentes familiares o personales.
- Deshidratación.
- Ser obeso.
- Cirugía y enfermedades digestivas

DIAGNOSTICO

La situación, tamaño y repercusión del cálculo se valoran con métodos de imagen:

- Ecografía
- radiografía simple de abdomen y TAC de abdomen.
- Análisis de sangre.
- Análisis de orina

TRATAMIENTO

Actualmente, la mayoría de los cálculos pueden eliminarse mediante procedimientos mínimamente invasivos:

- Tratamiento endourológico
- Litotricia extracorpórea por ondas de choque
- Medicamentos

INFECCIÓN URINARIA

SINTOMAS

- Necesidad imperiosa y constante de orinar
- Sensación de ardor al orinar
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades
- Aparición de sangre en la orina.
- Dolor en el costado o espalda
- Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico

FACTORES DE RIESGO

- Anatomía femenina.
- Actividad sexual.
- Ciertos tipos de anticonceptivos.
- Anormalidades en las vías urinarias.
- Obstrucciones en las vías urinarias.

Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

Las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria que los hombres

CAUSAS

- Las infecciones urinarias suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga.
- Existen diversos factores que inciden en la aparición de las infecciones urinarias y son variables en función de la edad y sexo

DIAGNOSTICO

- Examen físico
- Análisis de orina
- Cultivos de orina, líquido vaginal o líquido uretral
- Ecografía abdominal
- Urografía

TRATAMIENTO

- Generalmente, los antibióticos son el tratamiento de primera línea para las infecciones de las vías urinarias.
- Cuidado personal