



Nombre de alumno: Steiner Giovanni López Vázquez

Nombre del profesor: Lic. Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de los temas 3.5,3.6,3.7.

Materia: enfermería gerontogeriatrica

Grado: 6º cuatrimestre

Grupo: B

PASIÓN POR EDUCAR

Incontinencia fecal

¿Qué es?

es

la pérdida parcial o total de la capacidad para controlar voluntariamente la expulsión de gases y materias fecales

puede

Ocasionar la invalidación física y social del enfermo

puede

Clasificarse

total

es

La retención de gases y materias fecales sólidas o líquidas es imposible

parcial

es

el enfermo puede controlar la expulsión de heces sólidas, pero no de gases y heces líquidas o semilíquidas

Fisiología

el

mecanismo de la continencia fecal es un proceso complejo

destaca

la consistencia, el volumen y la velocidad con que la materia fecal llega al recto

es

proceso inconsciente, controlado por vías nerviosas medulares y locales, pero también se encuentra sometida al deseo consciente

puede

Clasificarse: idiopática, traumática, neurológica y congénita

tratamiento

es

Tratamiento médico
Tratamiento quirúrgico

Estreñimiento y diarrea

Trastornos intestinales

son

muy frecuentes y afectan a la totalidad de la población

pueden

prevenirse mediante una serie de medidas higiénicas y tratarse farmacológicamente.

La

La tarea principal del aparato digestivo

es

permitir que los alimentos que ingerimos puedan convertirse en nutrientes, para proveer a nuestro organismo de la energía (calorías) necesaria y los elementos fundamentales para la vida, eliminando los productos residuales en forma adecuada

Los

Laxantes

pueden

causar dependencia, puede servir de base para trastornos intestinales graves o bien causar una deshidratación excesiva

Diarrea

es

la presencia de heces acuosas, poco compactas y frecuentes, y se considera una condición crónica (continua o prolongada) cuando este tipo de heces se presenta durante más de 4 semanas.

en

Adultos generalmente es leve y se resuelve rápidamente sin complicación

En

Especialmente menores de 3 años, la diarrea conlleva peligro de deshidratación

su

causa más común es una infección viral, la intoxicación de alimentos y la diarrea del viajero

puede

Producirse por enfermedades como:

- Síndromes de malabsorción
- Enfermedad intestinal inflamatoria
- Síndrome del intestino irritable
- Inmunodeficiencia
- Dosis altas de radioterapia

y

no es una enfermedad, sino un síntoma de un trastorno cuya gravedad depende de la causa que lo origine

Estreñimiento

es

evacuación infrecuente y difícil de las heces, que se convierte en patología cuando se producen menos de tres evacuaciones semanales o bien dura más de tres días consecutivos.

puede

presentar estreñimiento ocasional al cambiar de hábitos

como

viajes, dietas, toma de medicamentos, estrés, trastornos emocionales, etc

puede

ser duradero o crónico

Existen

Algunas recomendaciones:

- Realizar ejercicio
- Alimentos ricos en fibra
- Beber abundantes líquidos
- Comer despacio y masticar bien
- Evitar uso de laxantes

Inmovilidad y caídas consecuencias

Síndromes de inmovilidad

se

origina por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas, condicionados por el envejecimiento y el desuso, manifestándose como deterioro funcional con limitación de la capacidad de movilización

es

Multifactorial y está determinado por factores predisponentes frecuentes en los adultos mayores

sus

Factores predisponentes son:

- Falta de fuerza o debilidad
- Rigidez
- Dolor
- Alteraciones del equilibrio
- Trastornos mentales

Factores predisponentes intrínsecos

algunos

Cambios producidos por el envejecimiento

se

producen cambios fisiológicos

También

Afecta a sistemas y aparatos: sistema músculo esquelético, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio,

También

Puede ser causado por enfermedades agudas y crónicas: enfermedades osteoarticulares,

Factores predisponentes extrínsecos

Algunos

Factores iatrogénicos

También

Factores ambientales

También

Factores sociales