

 Materia: ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA

• Carrera: Enfermería

• Semestre/ cuatrimestre: 6°B

 Alumna: Mara del Rocío Gómez López

cuya prevalencia es especialmente elevada en Las fracturas relacionadas mujeres posmenopáusicas y que sin la característicamen intervención adecuada conduce a un 13 osteodorosis es una entre dad te con la incremento del riesgo de padecer fracturas Orodesing the Orodesing the Orogest of the Orogest osteoporosis son óseas. la de cadera, vertebrales y de antebrazo distal (fractura de Cuidados de enfermería al anciano con Colles). La osteoporosis posmenopáusica se observa en mujeres problemas de 50 a 70 años de edad y se caracteriza por una pérdida osteoarticulares de hueso tubercular, por lo que las fracturas más La osteoporosis senil suele iniciarse después de frecuentes son los aplastamientos vertebrales y la La Usteupur Usis seriii suere iinerarse vespues ve pérdida de hueso trabecular y cortical (tercio fractura de tercio distal de radio y cubito.

indica sindosididad carbanica de la respectada de la resp

Este cuadro se produce en un breve espacio de tiempo. El diagnóstico es exclusivamente gasométrico.

Cuidados de enfermería al anciano con problemas respiratorios La ventilación
mecánica, desde
hace 30 años, se
utiliza como
soporte respiratorio
en pacientes con
insuficiencia
respiratoria aguda.
La ventilación
mecánica no
invasiva (VMNI)
comenzó a
utilizarse en la
década de los 70.

La enfermera debe de identificar dichas
proporcionar así un cuidado excelente.

No obstante, también existen numerosas

desventajas y/o complicaciones asociadas a la VMNI

como son: la lesión naso- rontal, irritación ocular,

distensión gástrica, úlceras faciales, alteración de

mucosas, dificultad de drenaje de secreciones. etc.