



Alondra Gabriela García Ramírez
María Cecilia zamorano
Enfermería medico quirúrgica II

Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de cirugía renal

> Normalmente la cirugía dura de 3 a 5 horas.

> Se le denomina "Nefrectomía"

- Acciones independientes

- > Valorar nivel de conciencia
- > Conectar drenajes
- > Toma de signos vitales
- > Observar signos de alerta
- > Medir diuresis horaria
- > Llevar balance hidromineral

- Determinar nivel de discomfort

- Cambiar el paciente de posición c/2 h.

- Mantener buena alineación corporal

- Evaluar pulso

- Plan de cuidados

- Brindar dieta
- Valorar ruidos
- Brindar ambiente agradable
- No brindar falsas esperanzas
- Brindar psicoterapia
- Necesidades de aprendizaje
- Promover listado de medicamentos.
- Enseñar al px cuidados
- Prevenir complicaciones.

Infecciones Urinarias

> Es la existencia de microorganismos en el tracto urinario.

> La ITU, es la segunda causa de infección más frecuente en humanos.

> Se Clasifica

- > Alta o baja
- > Aguda
- > Crónica

> Incidencia

Ocorre al menos 150 millones de casos al año.

> Etiología

El agente causal más frecuente es la *Escherichia coli* y durante el embarazo.

> Criterios Diagnósticos

- Muestra de orina
- Visualización en la tinción de Gram.
- Dos urocultivos $> 10^3$
- Prueba estándar para cualquier tipo de ITU.

Cuidados de enfermería en las infecciones urinarias.

- El tratamiento de la ITU depende si es complicada o no.

- El objetivo del tratamiento debe tener una respuesta rápida.

- En la ITU no complicada se usa

Trimetoprim sulfametoxazol.

- Se prefiere usar

- Macrolina
- Cefalosporinas de 1ra y 2da
- Amoxicilina / ácido clavulánico
- Quinolonas

- La bacteria asintomática debe ser tratada con antibióticos.

- En los pacientes incapaces de tolerar la medicación oral, requieren ser hospitalizados.

- Administración parenteral de:

- Ciprofloxacina
- Cefazidima
- Cefoperazona
- Cefepima
- Penicilina antipseudomonal

- Más frecuentes en la próstata

- Hiperplasia benigna
- Cáncer de próstata
- Prostatitis

- Síntomas Obstructivos

- Disminución miccional
- Micción entrecortada
- Dificultad para orinar
- Gotteo

Alteraciones urológicas que requieren cirugía urológica.

- Todo varón mayor de 45 años debería consultar con su urólogo

- El urólogo debe explicar al paciente

- el tratamiento

- Observación y revisiones periódicas.
- Higiene
- Tx médico
- Tx Quirúrgico

- Los pacientes con síntomas leves no precisan un tratamiento

- Los pacientes con síntomas moderados pueden mejorar con un tx médico.

