

Alum. Nohemí Rebeca Pérez Sánchez

Prof. Maria Cecilia Zamorano Rodriguez



ENFERMERÍA MEDICO QX

CUADROS SINÓPTICOS

6to cuatrimestre grupo °B ENFERMERÍA

¿En que consiste la operación?

Se le administrara anestesia general en el quirófano y no sentira ningun dolor durante la cirugía, se extraera uno de los riñones mediante una cirugía laparoscópica o abierta (nefrectomia).

Recepción del Paciente

- Valorar nivel de conciencia
- conectar y asegurar drenajes
- observar signos de sangramiento en herida quirúrgica
- Toma de signos vitales
- observar signos de Shock
- Monitorización de líquidos
- Reposo en cama elevada 15°
- Observar signos y síntomas de embolismo
- Vigilar dolor, edemas, color, hipotermia, pulso.

Cuidados de la Cirugía

- observar signos y síntomas de rechazo agudo de órgano
- Mantener vias aereas permeables
- Mantener higiene corporal y ambiental
- Mantener confort, alineación corporal, cambios de posición.
- Extremar medidas de asepsia y antisepsia

Vigilancia

- Evaluar color y temperatura de MI
- Realizar ejercicios activos y pasivos
- Mantener al paciente estimulado
- Ayudar al paciente con la higiene
- Movilizar al paciente tan pronto sea posible
- Brindar ambiente agradable
- Necesidades de aprendizaje del paciente y familiares
- Listado de medicamentos
- Medidas de control de infecciones

Plan de acciones o cuidados independientes

2.7. Cuidados de enfermería a Pacientes intervenidos de cirugía Renal

INFECCIONES URINARIAS

Concepto { existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas y de origen bacteriano

Características {

- constituye un problema de salud que afecta a millones de personas
- segunda causa de infección más frecuente
- Estudios han establecido que un tercio o más de los pacientes mayoritariamente son mujeres

Clasificación {

- **ITU Baja** {
 - Colonización bacteriana a nivel uretra y vejiga con signos como: urgencia, disuria, turbidez, olor fétido de orina, cistitis y uretritis
 - ITU no complicada
 - ITU complicada
 - ITU bacteriana asintomática
 - ITU recurrente
 - ITU nosocomial
- **ITU Alta** {
 - Presencia de signos y síntomas asociados a colonización ureteral y del parénquima renal, de escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos

Incidencia { Se estima que ocurren al menos 150 millones de casos de ITU al año, (las mujeres jóvenes comúnmente son afectadas) también es una infección frecuente en la infancia

Etiología { En más del 95% de los casos un único microorganismo es responsable de la ITU conocido como Escherichia coli, además que incluye otros microorganismos

Criterios diagnósticos {

- Bacteriuria sintomática de las vías urinarias
- Visualización de microorganismos en tinción Gram
- Escultivos
- Estudio de sedimento urinario
- Criterios: síntomas y presencia de estos

Cuidados de enfermería en las infecciones urinarias

Objetivo.

Realización del manejo de muestras de orina, además de pinzar y relectar de la sonda Foley si esta instalada.

- cada 12 a 24 hrs
- corroborar dosis
- horarios de antibioticoterapia

Tratamiento

- Depende de si es complicada o no complicada y siempre se debe tener en cuenta los factores de riesgo
- De forma empírica hasta encontrar un antibiótico con alta eficacia
- obtención de una respuesta rápida y efectiva
- Prevención de la recurrencia
- evitar aparición de la resistencia a los antibióticos

Elección de un antibiótico

- Depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad antimicrobiana alta
- concentración en el parénquima renal
- Para la decisión del uso se justifica o no en el tratamiento de la ITU.

Medicación Oral

Se considera en los pacientes con síntomas leves a moderados
Pacientes que puedan tolerar la vía oral
Debe incluir la administración parenteral de antibióticos

- Ciprofloxacina
- Cefazimidida
- Cefoperazona
- Cefepima
- Penicilina combinada

Alteraciones urológicas que requieren cirugía urológica

Enfermedades más frecuentes en la Prostata

- Hiperplasia benigna de prostata
- Cáncer de prostata
- Prostatitis

Prostatitis

Concepto: inflamación de la prostata producida por una infección bacteriana

- Tipos
- Prostatitis Bacteriana aguda: fiebre alta, molestias miccionales, dificultad al orinar.
 - Prostatitis bacteriana crónica: infección urinaria, dolor pelviano crónico o no (puede presentar síntomas)
 - Síndrome de dolor pelviano: crónico inflamatorio, crónico no inflamatorio
 - Prostatitis inflamatoria asintomática

Hiperplasia benigna de Prostata

Concepto: Glandula prostática que tiende a crecer con la edad, en la zona que rodea la uretra, variable de unos hombres a otros

Manifestaciones Clínicas

- Orinar con más frecuencia
- Levantarse por la noche a orinar
- Urgencia miccional

Síntomas

- Disminución de un flujo débil y lento
- Micción en varios tiempos
- Necesidad de hacer fuerza para comenzar la micción
- Goteo al terminar la micción
- Sensación de vaciamiento incompleto en la vejiga
- Retención de orina

Cancer de Prostata

Sintomas { Muy tardamente, parecidas a las de HBP, dolores óseos, se desarrolla en la zona periférica de la prostata

Tipos { *Maligno
*Benigno

Revisión { - Varón mayor de 45 años
- Por antecedentes familiares
- hiperplasia
- 1 vez al año