

**Nombre del alumno:**

**López Vázquez Osvaldo Rafael**

**Materia:**

**Medico quirúrgica II**

**Grado: 6to cuatrimestre grupo:  
"B"**

**Docente:**

**MARIA CECILIA**

**ZAMORANO RODRIGUEZ**

**Carrera:**

**Lic. En enfermería general**

2.7

CUIDADOS DE ENFERMERIA A PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGIA RENAL.

PLAN DE ACCIONES O CUIDADOS INDEPENDIENTES.

PLAN DE ACCIONES INDEPENDIENTES

PLAN DE CUIDADOS

- > VALORACION NIVEL DE CONCIENCIA.
- > CONECTARY ASEGURAR DRENAGE.
- > OBSERVAR SIGNOS DE SANGRAMIENTO EN HERIDAS QUIRURGICAS.
- > TOMA DE SIENOS VITALES.
- > PREVENIR EN CAMA.
- > MANTENER VIAS PERMEABLES.
- > EVITAR HIPOTERMIA.
- > MANTENER HIGIENE CORPORAL.

- > MANTENER EL PACIENTE ESTIMULADO.
- > DETERMINAR NIVEL DE DISCONFORT.
- > CAMBIAR AL PACIENTE DE POSICION.
- > EVALUAR PULSO.
- > EVALUAR COLOR Y TEMPERATURA.
- > EVITAR RUIDOS EXCESIVOS.
- > ASISTIR AL PACIENTE EN EL BAÑO.
- > REINICIAR DIETA SEGUN LO TOLERE.
- > MONITORIZAR TEMPERATURA.
- > ASEPSIA Y ANTISEPSIA.

- VALORAR RUIDO
- BRINDAR AMBIENTE AGRADABLE.
- PSICOTERAPIA.
- EXPLICAR NECESIDADES HQ
- VALORAR SIGNO DE SANGRADO.
- PREVENIR COMPLICACIONES

2.8 INFECCIONES URINARIAS

DEFINICION

ES CONSIDERADA GENERALMENTE COMO LA EXISTENCIA DE MICROORGANISMOS PATOGENOS EN EL TRACTO URINARIO CON O SIN PRESENCIA DE SINTOMAS

- o ITU BAJA
- o ITU COMPLICADA
- o ITU ALTA
- o ITU NO COMPLICADA
- o ITU RECORRENTE
- o ITU NOSOCOMIAL

INCIDENCIA.

- o SE ESTIMA QUE GLOBALMENTE 150 MILLONES OCURREN AL AÑO
- o EN PERU SE DESCONOCEN LAS CIFRAS
- o LAS MUJERES SON MAS COMUNES
- o LA ITU ES UNA INFECCION BACTERIANA MAS FRECUENTE EN LA INFANCIA.
- o A LOS 7 AÑOS EL 8% DE LAS NIÑAS Y EL 2% DE LOS VARONES AN SUFRIDO ITU.
- o EL 95% DE LOS CASOS

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

- SINTOMATICA.
- FIEBRE  $\geq 38^{\circ}$
- POCA QUIRIA / DISURIA
- MUESTRA DE ORINA. (100 CMM)
- EXAMEN MICROSCOPICO.
- ANÁLISIS URINARIO ORCULTIVO.

29

## CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS INFECCIONES URINARIAS.

LA ENFERMERIA CLINICA TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO DE MUESTRAS DE CRINA

LA ELECCION DE ANTIBIOTICO, EN DIVERSAS INFECCIONES, DEPENDE DE LOS NIVELES DE CONCENTRACION PLASMATICA.

CUANDO SE ELIGE UN BETA-LACTAMICO, DEPENDE DEL TIEMPO DE LA CONCENTRACION DEL ANTIMICROBIANO.

EN LA ITU NO COMPLICADA SE HA UTILIZADO TRIMETOPRIMSULFAMETOXAROL.

LA BACTERIURIA ASITOMATICA DEBE SER TRATADA CON ANTIBIOTICOS EN LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA O MANIPULACION UROLOGICA Y TRANSPLANTE RENAL.

2010

## ALTERACIONES UROLOGICAS QUE REQUIEREN CIRUGIA UROLOGICA.

LAS TRES ENFERMEDADES QUE SE DESARROLLAN MAS FRECUENTES A PARTIR DE LA PROSTATA SON

- > HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA
- > CANCER DE PROSTATA.
- > PROSTATITIS.

PROSTATA BACTERIANA AGUDA.

CORSA CON FIEBRE ALTA, DIFICULTAD PARA ORINAR.

PROSTATITIS BACTERIANA CRONICA

SUELE CORSAR CON EPISODIOS REPENTINOS DE INFECCION URINARIA Y PUEDE NO PRESENTAR NINGUN SINTOMA.

SINDROME DE DOLOR PELVICO

> SINDROME DE DOLOR PELVICO CRONICO INFLAMATORIO

> S. DOLOR PELVICO CRONICO NO INFLAMATORIO.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA

TIENE A CRECER CON LA EDAD A PARTIR DE LOS 40-45 AÑOS. ESTE CRECIMIENTO ES MUY VARIABLE EN LOS HOMBRES

EL CANCER DE PROSTATA SE PRODUCE POR UN CRECIMIENTO MALIGNO DENTRO DE LA PROSTATA ES EL TUMOR MAS FRECUENTE EN LOS HOMBRES.

QUE SINTOMAS PRODUCE  
EL CANCER DE PROSTATA

○ HABITUALMENTE NO PRESENTA SINTOMAS, O LOS PRODUCE MUY TARDIAMENTE.

○ SOLO PRESENTA SINTOMAS CLINICOS 7 DECADA 9 HOMBRES

○ CUANDO EL CANCER SE HA EXTENDIDO FUERA DE LA PROSTATA, SOBRE TODA LA PROSTATA Y HUESOS PRODUCE DOLORS OSEO.

CADA CUANTO TIEMPO  
DEBO REVISARME

○ TODO VARON A PARTIR DE LOS 45 AÑOS DEBE REVISARCE 1 VEZ POR AÑO.

Y A LOS 40 AÑOS LA VASECTOMIA.

COMO PUEDO TRATAR  
LA HIPERPLASIA

○ OBSERVACION Y REVISIONES PERIODICAS

○ TRATAMIENTO HIGIENICO - DIETETICO

○ TRATAMIENTO MEDICO.

○ TRATAMIENTO QUIRURGICO.

○ EXTRACTOS DE PLANTAS

○ ALFA - BLOQUEANTES.