

DOCENTE: María Cecilia Zamorano Rodríguez

ALUMNA: Guadalupe del Carmen Hernández Velasco

MATERIA: Enfermería Médico Quirúrgico II

LICENCIATURA: Enfermería

CUATRIMESTRE: 6"B"

4.6 Fisiopatología de la nariz, garganta y oído.

Que es la Nariz

Es el organo del olfato situado en el centro de la cara.

ESTA FORMADA POR:

- MEATO EXTERNO: Proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara.
- LOS ORIFICIOS NASALES: dos cámaras divididas por tabiques nasal.
- EL TABIQUE NASAL: Formado por cartilago y hueso y recubierto por membranas mucosas.
- LA FOSA NASAL: conductos recubiertos por una membrana mucosa y diminutos pelos (cilios)
- SENOS PARANASALES: cuatro paredes de cavidades llenas de aire.

Que son los Senos Paranasales

son cavidades o bolsas llenas de aire, cerca de las fosas nasales.

TIPOS DE SENOS PARANASALES:

- ETMOIDAL: Ubicado dentro del rostro, alrededor del puente de la nariz.
- MAXILAR: Ubicado dentro del rostro, alrededor de la zona de las mejillas.
- FRONTAL: Ubicado dentro del rostro, alrededor de la zona de la frente.
- ESFENOIDAL: Ubicado en la profundidad de la cara, detrás de la nariz.

Que es la Garganta

Tubo similar a un anillo muscular que actua como el conducto para el aire, los alimentos y los líquidos.

FORMADA POR:

- LA LARINGE: Grupo cilindrico de cartilagos musculosos y tejido blando que contiene las cuerdas vocales.
- LA EPIGLOTTIS: Acta formada por tejido blando ubicada sobre las cuerdas vocales.
- LAS AMIGDALAS Y LAS ADENOIDES: Se componen de tejidos linfaticos y se ubican en la parte posterior en los costados de la boca.

Que es el oído.

Organos de la audición y el equilibrio

PARTES DEL OIDO.

- * OIDO EXTERNO: Formado por Pabellon auricular, o la oreja.
- Conducto auditivo externo: conducto que conecta el oido externo al oido interno.
- TIMPANO: Membrana separada el oido externo del oido medio.
- * OIDO MEDIO: Los huesillos, Martillo, Yunque, Estríbo, la trampa de Postaquino.
- * OIDO INTERNO: Formado por la coclea, el vestibulo, los conductos semicirculares.

4.7 Valoración y Problemas generales en pacientes con alteraciones otorrinolaringológicas.

INFECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS ALTAS

Es una de las enfermedades
más frecuentes que provoca
más visitas al médico y
ausencia a la escuela o
al trabajo.

Datos sobre el resfriado o URI.

- La mayoría de los niños desarrollan entre seis y ocho resfriados como mínimo.
- Son menos frecuentes luego de los 6 años.
- Los adultos se resfrían entre dos y cuatro veces por año.

¿CUAL ES LA TEMPORADA DE RESFRIADO?

Son durante el
otoño y el invierno
desde fines de agosto
o principios de septiembre
hasta marzo o abril.

Causas de mayor resfriado.

A que niños están
en ambientes cerrados
y cerca de otros.

¿QUE CAUSA EL RESFRIADO COMUN?

El origen de
los síntomas
de un resfriado
puede ser más de
200 variedades.

Las más comunes.

El rinovirus,
otros virus
Incluye el
• Coronavirus.
• Parainfluenza
• Adenovirus.
• Enterovirus.
• Virus sincitial.

EN QUE SE DIFERENCIA UN RESFRIADO DE LA GRIPE.

- Los resfriados son relativamente inofensivos y suelen curarse solo al cabo de un tiempo, aunque a veces pueden producir una infección secundaria (los oídos).
- La gripe también puede ser inofensiva, pero puede evolucionar en una complicación más grave: la neumonía o incluso la muerte.

SINTOMAS

- RESFRIADO: Fiebre baja, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal, estornudos, dolor de garganta.
- GRIPE: Fiebre alta, goteo nasal, fatiga, Agotamiento, dolores, y molestias severas frecuentes.

4.8 Alteraciones de las vías respiratorias bajas.

LA NEUMONIA

Es una infección de uno o dos pulmones.

Causa

Bacterias, virus o hongos. Al inhalar líquidos o químicos.

Síntomas.

Fiebre alta
Escalofríos
Tos con flema
Falta de respiración
Dolor de pecho.

BRONQUITIS

Es la hinchazón e inflamación de las vías aéreas principales que llevan aire hacia los pulmones.

Tipos de bronquitis.

Bronquitis aguda: viene después de haber tenido un resfriado, o una enfermedad seudogripal, causada por un virus, dañando la nariz, los senos paranasales, y la garganta.

Bronquitis crónica infección prolongada, para tener este tipo de bronquitis debe tener una tos con flema.

EPOC

Enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones.

Síntomas.

Dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad
Silbido al respirar.

Causas.

Los países desarrollados es el tabaquismo y los países en vías de desarrollo están expuestos a gases combustibles.

4.9. Cuidados de enfermería a pacientes con problemas e intervenidos de oído, nariz y garganta.

Preparar la Unidad de recuperación del paciente

Fundamentación

Disponer de recursos físicos y humanos que existan en el hospital

Ya que esto:

Aumenta los estándares de calidad en la atención al paciente recién egresado de la cirugía

Control y registro de los signos vitales

Fundamentación

La anestesia y la pérdida de los líquidos en el paciente contribuyen en la alteración de los signos vitales.

Recibir al paciente con el expediente clínico correcto

Fundamentación

La realización del equipo de salud influye en el paciente

Es tener

los conocimientos físicos sobre el estado en el que es recibido el paciente

Colocar y proteger al paciente en la posición indicada o requerida

Fundamentación

La posición del paciente se determina a partir de dos factores

los cuales son:

Anestesia inducida y el tipo de cirugía que fue realizado

FECHA

4.10. Cuidados de enfermería en las urgencias de ORL

Atender a la ambulación del paciente

Fundamentación

Evita complicaciones futuras

La aplicación de la mecánica coreal

influye en el adecuado funcionamiento gastrointestinal y la correcta circulación de la sangre

Participar o colaborar en la dietoterapia

Fundamentación

La dieta prescrita depende del tipo de cirugía practicada y de las necesidades que tenga el paciente

Atención a la diuresis

Fundamentación

La supresión urinaria después de la cirugía

Es consecuencia

Del estrés causado por la intervención quirúrgica, la posición y la presencia de espasmo en el meato urinario

Atención a las complicaciones

Fundamentación

Puede ser menores (nauseas, vómito, distensión abdominal) o mayores (obstrucción del retorno venoso, embolia)

Bibliografía

Enfermería Medico Quirúrgica II . (Mayo – Agosto de 2019). Obtenido de Enfermería Medico Quirúrgica II :
file:///C:/Users/2020/Downloads/Medico%20quirurgica%20II%20antologia%202.pdf