


- 
- Materia: quirúrgica II
 - Carrera: Enfermería
 - Semestre/ cuatrimestre: 6°B
 - Alumna: Mara del Rocío
Gómez López

Insuficiencia renal aguda y crónica

La insuficiencia renal es el daño de los riñones.

Aguda y crónica.

Hay 2 tipos diferentes de insuficiencia renal:

Los síntomas de la insuficiencia renal aguda.

La aguda comienza en forma repentina y es potencialmente reversible.

La crónica progresa lentamente durante un periodo de al menos 3 meses.

- Hemorragia
- Fiebre
- Erupción
- Diarrea con sangre.
- Palidez
- Dolor abdominal.

Síntomas de la I.R.C

- Falta de apetito
- Vómitos
- Dolor de huesos
- Dolor de cabeza
- Mal aliento.

Cuidados de enfermería a pacientes con insuficiencia renal.

La enfermería tiene como objetivo cuidar al individuo como ser integral.

La educación terapéutica del usuario exige mucho más que una simple transmisión.

Antes de determinar la intervención educativa, se debe de explorar cuáles son sus motivaciones.

El desarrollo de estas guías se realiza:

Un abordaje integrado en relación al plan de cuidados de enfermería.

Una de las acciones más relevantes y pertinentes que el profesional que puede y debe realizar.

La valoración del riesgo y la realización de intervenciones constituyen:

Cuidados de enfermería
a pacientes con diálisis
peritoneal, hemodiálisis.

Objetivo

↓
Dar al paciente y
al familiar colaborador
la información para
desarrollar actitudes y
habilidades.

↓
Notas/observaciones.

↓
Tener en cuenta coordinación/
colaboración del facilitador
a que lleve un buen desarrollo.

Material

↓
Historia clínica,
h. de enfermería
material de
recogida de datos,
material didáctico,
etc.

