



Nombre de alumnos: Dania marthita flores Abelar

**Nombre del profesor: BEATRIZ
GORDILLO LOPEZ**

Nombre del trabajo: mapa mental

Materia: enfermería del adulto

Grado: sexto

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 121 de junio de 2020 .



Fase 1. Prediagnóstico y diagnóstico: intervalo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico definitivo.
Progreso anatómico y clínico de la enfermedad.

Fase 2. Enfermedad establecida: se caracteriza por el alivio de los síntomas y la instauración de las modalidades de tratamiento.

Fase 3. Deterioro y declinación: cuando no queda nada por hacer, se caracteriza por la aplicación de cuidados paliativos, ya que hay una falla de los mecanismos de homeostasis del organismo

Es importante que el paciente y los familiares sientan que reciben la mejor atención posible. Para ello el personal de la salud debe entender que el paciente debe ser tratado desde un punto de vista biopsicosocial, así como conocer una serie de manifestaciones y necesidades por las que transcurre el enfermo terminal



Cuidados de enfermería en el paciente oncológico".

Colocar sonda permanente aumentando diámetro de la misma paulatinamente.

Colocar culeros innovados con tirantes o desechables según preferencia y posibilidades.

Cambiar de posición para evitar las úlceras por decúbito según estado del paciente.

Perfumarlos y utilizar desodorantes para evitar aires desagradables.

El paciente necesitará medidas de apoyo (almohadas) para facilitar cambios de posición y evitar estancamiento de la sangre.

Colocar colchón antiescara.

Curar lesiones que aparezcan

Tratar de administrar por vía intravenosa los analgésicos ya que como la circulación disminuye se reduce eficacia de los analgésicos.

Aplicar pirámide analgésica, para administrar narcótico, se debe usar frecuente, sin interrupción por vía subcutánea ya que la vida media del medicamento dura más en sangre, en los dolores muy intensos usar narcótico endovenoso.



Disminución del peristaltismo: el paciente está anoréxico pero suele desear sorbos frecuentes de agua, es posible que tenga seca la boca por la deshidratación y febrícula que precede a la muerte:

Mantener buena higiene bucal.

Alimentación parenteral según estado, ya que se distiende el abdomen y puede causar náuseas.

Tomar sorbos de agua de vez en cuando

