

Alum. Nohemí Rebeca Pérez Sánchez

Prof. Marcos Jhodany Argüello Galvez



## ENFERMERÍA DEL ADULTO

Cuadro Sinóptico

6to cuatrimestre grupo °B ENFERMERÍA

# VALORACION DEL PACIENTE ADULTO

## Valoración

Forma de actuación ordenada y sistemática encaminada a solucionar los problemas relacionados con la salud

Método de resolución de problemas ante las situaciones que puedan presentarse

## Concepto

Es un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e interpretación de información sobre el estado de salud del paciente

## Características

- Recolección de información para realizar intervenciones enfermeras
- Se realiza de forma individualizada
- Deber ser continua y conlleva una serie de fases
- Diagnostica, planifica, interviene y evalúa

## Fases

### Planificación

Tiene que estar pensado el procedimiento que se va a realizar, no de manera improvisada

### Sistematizada

Requiere un método para su realización

### Continua

Da comienzo al contacto con el paciente y dura el tiempo que este necesite de cuidados enfermeros

### Deliberada

Con actitud reflexiva, consciente y con objetividad

## Objetivo

Captar en cada momento la situación de salud que están viviendo las personas, así como su respuesta a la misma

## VALORACION DEL PACIENTE ADULTO

### Valoración inicial

En base al plan de cuidados, primer contacto con la persona

- Datos generales
- Factores influyentes
- Ejecución de intervenciones

### Valoración continúa

Posterior o focalizada, realizada de forma progresiva durante toda la atención

- Recolección de datos para descubrir el retroceso del problema
- Revisiones y actuaciones de plan
- Obtención de nuevos datos

### Valoración general

Reconoce y detecta situaciones que necesiten la puesta en marcha de planes de cuidados

### Valoración focalizada

Se centra en conocer aspectos específicos del problema o situación detectado o sugerido por la persona

### Valoración primaria

Respuesta del paciente

1. Consciente
2. Inconsciente

### Valoración secundaria

Solo se realiza en aquellos casos en que las funciones vitales del paciente lo permitan