

**Nombre:** Julissa Guadalupe Díaz Sánchez



**Docente:** María Cecilia zamorano Rodríguez

**Materia:** enfermería medico quirúrgica II

**Fecha de entrega:** 18 de Junio del 2020

Se le administrará anestesia general en el quirófano

Normalmente las cirugías tardan de 3 a 6 horas incluyendo el tiempo posterior mediante una cirugía laparoscópica.

Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de Cx renal

Plan de acciones o cuidados

- Valorar nivel de conciencia
- Conectar y asegurar drenajes
- Observar signos de sangramiento en heridas quirúrgica
- Toma de S.V. Pulso Periférico c/2 hrs.  
T/A c/1 hr.  
Temp. C/1 hr.
- Medir diuresis horaria
  - Dolor
  - Ausencia de pulso
  - Edemas
  - Calambres
  - Hipotermia
  - Entumecimiento
- Vigilar
- Mantener higiene corporal y ambiental
- Determinar nivel de discomfort
- Cambiar de posición c/2 horas
- Evitar ruidos excesivos
- Brindar dieta desecada
- Monitorizar nivel de proteínas
- Brindar ambiente agradable
- No brindar falsas expectativas

# Infecciones Urinarias

Las infecciones del tracto urinario es considerado generalmente como existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas

con clasificadas de diversas formas Alta o baja Aguda o crónica

## Incidencia

Se estima que globalmente ocurre al menos 150 millones de casos de ITU por año U.U., 7 millones de consultas son solicitadas cada año por ITU.

La incidencia de ITU estimada en los hombres jóvenes con respecto a las mujeres de la misma edad significativamente inferior

## Etiología

La más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la ITU al agente etiológico más frecuente de ITU en zombos seos es la Escherichia coli, responsable del 75% a 80% de casos

El 20% a 25% restante incluye microorganismos como Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Aerobacter, Klebsiella

## Pruebas Diagnósticas

Bacteriemia sintomática de las vías urinarias es diagnosticada por cultivos de los sig. criterios

Signos y síntomas Tenesmo Polaquuria Dolor o dolor suprapúbico

Cuidados de enfermería en las infecciones urinarias

• La enfermera clínica tiene como principal objetivo la realización de manejo de muestras de orina además de pinzar y recolectar de la sonda foley si esta es que está instalada la muestra cada 12 o 24 horas, además de corroborar dosis y horarios de antibioterapia

• En la ITU no complicada se ha usado de rutina trimetoprim-sulfametoxazol pero estudios recientes demuestran que su susceptibilidad es baja

• En el caso de la pielonefritis no complicada, la terapia oral debería ser considerada en los pacientes con síntomas leves a moderados que no tienen condiciones morbosas concomitantes y que pueda tolerar la vía oral.

• En los pacientes incapaces de tolerar la medicación oral o que requieran ser hospitalizados debido a una ITU

501

Las tres enfermedades que desarrollan más frecuentemente a partir de la próstata son

- Hiperplasia benigna de próstata
- Cáncer de próstata
- Prostatitis
  - Prostatitis crónica
  - Dolor pelviano crónico

¿Qué es la prostatitis?

Es una inflamación de la próstata producida habitualmente por una infección bacteriana

Alteraciones urológicas que requieren cirugía urológica

Tipos de prostatitis

- P. Bacteriana Aguda
- P. Bacteriana crónica
- P. Inflamatoria Asintomática

¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata?

La glándula prostática tiende a crecer con la edad y a partir de los 40-45 años la próstata empieza a crecer fundamentalmente en la zona transicional.

Opciones de Tx

- Observación y revisiones periódicas
- Tx Higiénico-Dietético
- Tx Médico
- Tx quirúrgico

(Antología Enfermería Médico Quirúrgica , 2020)

## Bibliografía

(2020). *Antología Enfermería Médico Quirúrgica* . Comitan de Dominguez Chis: Universidad del Sureste .