



- Enfermería Medico Quirúrgico II
- María Cecilia Zamorano Rodríguez
- Licenciatura en Enfermería
- Nayeli Castillejos Ramírez
- 6°-C
- Tarea: I

Cuidados De Enfermería Pacientes Intervenido de Cirugía Renal

En que consiste la operación

En general, se le administra anestesia general en el quirófano.

Duración

Normalmente la cirugía de 3-5 horas, Includiendo el tiempo posterior en la sala de recuperación para la observación.

Plan de acciones o cuidados

- Recepción al paciente
- Valorar el nivel de conciencia
 - conectar y asegurar drenajes
 - observar signos de sangramiento
 - observar signo de shock
 - Reposo en cama con IM en 15 grados

Plan de acciones o cuidados

- Determinar nivel de discomfort
- Cambiar al paciente de posición C/2h
- Mantener buenas alineación corporal
- Evaluar pulsos
- Examinar MI (edema, varices)

Plan de acciones o cuidados

- Brindar dieta deseada por el paciente
- Monitorear nivel de proteínas plasmáticas
- valorar ruidos
- Brindar ambiente agradable
- Explicar Necesidad de Ingesta equitativa de nutrientes.

- Ayudar al paciente a identificar el peso deseado, tener en cuenta el peso ideal.
- Brindar reacciones de tensión moderado
- Brindar psicoterapia de apoyo
- Evaluar necesidades de aprendizaje del paciente y familiares.

Infecciones Urinarias

Definición La infección del tracto urinario (ITU) es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

Clasificación ITU Baja: Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios, como urgencia, disuria, polaquiuria, tenesmo y olor fétido de orina.

Clasificación ITU Alta: Presencia de signos y síntomas de ITU baja, asociada a colonización bacteriana a nivel uretral y del parenquima renal, con signos y síntomas sistémicos.

ITU Complicadas: ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o a fracaso del tratamiento.

ITU no complicadas: La que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones anatómicas o funcionales, cuyos síntomas estén confinados a la uretra y vejiga.

ITU o bacteriuria asintomática: Muchos pacientes pueden tener una bacteriuria significativa.

ITU nosocomiales: Aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la hospitalización de un paciente sin evidencia de infección.

Cuidados De Enfermería En Las Infecciones Urinarias

Objetivo Realización de manejo de muestras de orina, cultivos de pinzor y recoblar de la sonda Foley.

Tratamiento El tratamiento de la ITU depende si es complicada o no complicada y siempre debe tener en cuenta factores de riesgo.

Los objetivos del tratamiento deben ser la obtención de una respuesta rápida y efectiva, prevención de la recurrencia y evitar la aparición de resistencia a los antibióticos.

La elección de un antibiótico, en diversas infecciones, depende de concentración plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad antimicrobiana alta.

- Cuidados De enfermería**
- ▶ Instruir al paciente que tome cierta cantidad de agua (6-8 vasos por día).
 - ▶ Indicar una dieta, sin irritantes como alcohol, café, picante, etc.
 - ▶ Si el paciente usa pañal, indicar la higiene y cambio frecuentemente para evitar lesiones o infecciones.

- ▶ Realizar una limpieza genital de adelante hacia atrás usando agua tibia.
- ▶ Indicar una elaboración de vistas al baño que le permita ir varias veces durante el día.
- ▶ Lavarse las manos antes y después de cada episodio de incontinencia.

Definición

Las tres enfermedades que se derivan más frecuente a partir de la Prostata son:
- Hiperplasia Benigna de Prostata
- Cáncer de Prostata
- Prostatitis

Alteraciones Urológicas que requieren Cirugía Urológica

Prostatitis

Es una inflamación de la Prostata. Puede ocurrir habitualmente por una infección bacteriana.

- Tipos:
- Aguda: fiebre alta, molestias intensas, dificultad para orinar
 - Crónica: episodios repetidos de infección urinaria
 - Dolor crónico pélvico:
 - o inflamatorio
 - o no inflamatorio

Hiperplasia Benigna de Prostata

La glándula prostática tiende a crecer con la edad de los 40-45 años. Sobre todo en la zona funcional que rodea la uretra.

Síntomas

- Disminución de la fuerza y calibre miccional
- Goteo al terminar la micción
- Incapacidad para orinar

Cáncer de Prostata

Se produce por un crecimiento maligno dentro de la Prostata, con mayor frecuencia en la zona periférica. No produce síntomas.