



Yessenia Alfaro Santis

María Cecilia Zamorano Rodríguez

Cuadro sinóptico

Enfermería medico quirúrgico II

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: “C”

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de junio del 2020

Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de cirugía renal.

Operación

consiste en la administración de anestesia general en el quirófano. Con sumo cuidado, extraerán uno de sus riñones y se lo trasplantarán al receptor.

Plan de acciones o cuidados.
Acciones independientes.

* Recepción del paciente.

- Valorar nivel de conciencia.
- Conectar y asegurar drenajes
- Observar signos de sangramiento en herida quirúrgica.
- Medir diuresis horaria
- Llevar balance hidromineral.
- Cambiar paciente de posición
- Evaluar pulsos
 - Radial
 - Pedal
 - tibial posterior
- Evitar ruidos excesivos
- Limitar contacto con personas ajenas.
- Promover deambulación precoz.

Infecciones Urinarias

Infección del tracto urinario.

Es considerado generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario.

Los ITU son clasificados de diversas maneras.

alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria o nosocomial.

incidencia.

La ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes de la infancia. A los 7 años, aproximadamente, 8% de las niñas y 2% de los varones han tenido al menos un episodio.

Diagnóstico

Bacteriuria asintomática apropiada

Paciente asintomático al que se le detecta una concentración bacteriana con no más de una a dos especies de microorganismos.

Cuidados de enfermería en las infecciones Urinarias.

La enfermería Clínica tiene como principal objetivo.

- manejo de muestras de orina
- pinzar y recolectar de la sonda foley y si está instalada.

La elección de un antibiótico.

En diversas infecciones, depende de los niveles de concentración plasmática que alcanza el antibiótico para lograr una susceptibilidad antimicrobiana alter.

En caso de las Pielo nefritis no complicadas.

La terapia oral debería ser considerada en los pacientes con síntomas leves a moderados, que no tienen condiciones morbidas concomitantes y que pueden tolerar la vía oral.

El tratamiento empírico con fluorocuonolonas

es de elección porque son útiles tanto en la ITU complicada como en la no complicada, las más usadas son la ciprofloxacina y la norfloxacina.

Alteraciones Urológicas que requieren Cirugía Urológica.

Enfermedades que se desarrollan más frecuentes.

- Hiperplasia Benigna de próstata
- Cáncer de próstata
- Prostatitis.

Prostatitis

Es importante diagnóstico precozmente y ofrecer un tratamiento curativo.

Prostatitis TIPOS

Prostatitis Bacteriana aguda: Se diagnostica por la clínica del paciente y un cultivo de orina, de semen y de orina

Prostatitis Bacteriana crónica: se diagnostica o necesario realizar cultivo de orina, de semen y de orina post masturbación o masaje prostático