

Nombre de la alumna: López López
Verónica

Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano

Nombre del trabajo: Cuadros
sinópticos

Materia: Enfermería médico
quirúrgica II

Grado y Grupo: Sexto "C"

Cuidados de enfermería a pacientes intervenidos de cirugía renal.

¿En que consiste la operación?

Consiste en administrar anestesia y el paciente estará dormido y no sentirá dolor durante la cirugía. Y con mucho cuidado extraerán uno de sus riñones y se lo transplantarán.

* Plan de acciones o cuidados.
Acciones Independientes.

→ Recepción del paciente

- > Valorar nivel de conciencia
- > Conectar y asegurar drenajes
- > Observar signos de sangramientos en herida quirúrgica.
- > Tomar signos vitales; pulsos periféricos c/2 hrs
- > Observar signos de shock
- > Medir diuresis horaria
- > Reposo en cama con MI elevados en 15 grados.

* Plan de cuidados.
Acciones independientes

- > Valorar nivel de discomfort
- > Cambiar al paciente de posición c/2 hrs.
- > Mantener buena alineación corporal
- > Evaluar pulsos
- > Evaluar color y temperatura.

Infecciones Urinarias

¿Qué es?

La infección del tracto urinario es considerada generalmente como la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

El origen bacteriano de la ITU es el más frecuente, la definición exacta exige no solo la presencia de germen en la vía urinaria sino también su cuantificación en al menos 10⁵ unidades formadoras de colonias.

Clasificación

Se clasifica de diferentes formas

> ITU baja

Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios.

> ITU alta

Presencia de signos y síntomas de ITU baja asociada a colonización a nivel bacteriana.

> ITU no Complicada

La que ocurre en pacientes que no tienen tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas.

Cuidados de enfermería en las infecciones urinarias

*Objetivo

La realización de manejo de muestras de orina además de pinzar y recolectar de la sonda foley, si es que está instalada.

Además de corroborar dosis y horarios de antibioticoterapia.

*Tratamiento

Depende si es o no complicada y siempre se debe tener en cuenta los factores de riesgo.

Es importante seleccionar en forma empírica hasta que se cuente con el resultado del urocultivo.

*Pielonefritis no complicada

La terapia oral debería ser considerada en los pacientes con síntomas leves o moderados que no tienen condiciones mórbidas concomitantes.

* En los pacientes incapaces de tolerar la medicación oral o que requieren ser

hospitalizados, la terapia inicial debe incluir la administración parental

Hay tres enfermedades que se desarrollan más frecuentemente a partir de la próstata

> Hiperplasia benigna de próstata

{ Crecimiento benigno

> Cáncer de próstata

{ Crecimiento maligno

Prostatitis

{ Infección

Alteraciones Urológicas que requieren cirugía urológica

¿Qué es prostatitis?

Es una inflamación de la próstata producida habitualmente por una infección bacteriana.

* Prostatitis bacteriana aguda

* Prostatitis bacteriana crónica

¿Qué es hiperplasia benigna de próstata?

Este crecimiento de unos hombres a otros.

{ Puede comprimir la uretra y es la responsable de la aparición de los síntomas urinarios.

Síntomas

• Poliuria

• Nicturia

• Urgencia miccional