

- 
- Materia: enfermería medico quirúrgica
  - Carrera: Lic. En enfermería
  - Cuatrimestre: 6° cuatrimestre
  - Alumno: Edison moisés Pimentel cruz
  - Catedrático/a: María Cecilia Zamorano



# 2.7 Cuidados de enfermería a pacientes con Intervenciones de Cirugía renal

¿en que consiste la operación?

En general se administra anestesia general en el quirófano

¿dónde y el receptor estarán en Quilofanos adyacentes

acciones independientes

Recepción del paciente

- Observar signos
- Signos vitales
- Sangramiento

acciones independientes

• Observar signos de shock  
• Medir diuresis

- Llevar balance hidromineral
- Reposo en cama

acciones independientes

• dieta dada  
• monitorizar nivel proteico  
• evaluar ruidos

- brindar psicoterapia
- Monitorizar signos de infección

# Infecciones urinarias

Es considerada generalmente como la existencia de microorganismos.

El origen bacteriano es más frecuente

80-90%

## Clasificación

Las IU son clasificadas por diversas formas

- alta
- baja
- crónica

## Clasificación


- no complicada
- complicada
- somática
- asintomática

- Nueva
- recurrente
- comunitaria
- nosocomial

## Incidencia

Se estima globalmente ocurren menos 150 millones de casos de IU por año

Las niñas jóvenes son comúnmente afectadas, con una frecuencia de 0,5 a 0,7 infecciones



2.9 cuidados de enfermería en la infección urinarias

Objetivo

la enfermera tiene como Principio Objetivo

Realización de Manos de Higiene

Tratamiento

depende si es complicada o no complicada

siempre se debe tener en cuenta a los factores de riesgo, es importante seleccionar en forma empírica

Antibióticos

La elección de un antibiótico en diversas ocasiones depende de los niveles de concentración

cuando se elige un beta lactámico el éxito terapéutico depende del tiempo en que

## 2.10 Alteraciones Urológicas que requieren Cirugía Urológica

### Enfermedades

Las enfermedades que se desarrollan más frecuentemente a partir de la Prostata son:

- Hiperplasia
- Cáncer de Prostata
- Prostatitis

### Diagnóstico

Es importante realizar un correcto dx diferencial para indicar el TX

en hombres de 60 años, la enfermedad más frecuente es la hiperplasia benigna

### Cada cuanto debo revisarme?

todo varón mayor de 45 años debería consultar con su urólogo

en varones con antecedentes familiares de cáncer

(uds, 2020)

## Bibliografía

uds. (2020). *enfemeria medico quirurgica* . comitan: chiapas.

