



Nombre de la alumna:

Eligia Mabel Maldonado Domínguez

Nombre del profesor:

María Cecilia Zamorano Rodríguez

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico

Materia:

Enfermería Médico Quirúrgico

Grado y Grupo:

6to cuatrimestre "C"

2.7.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA RENAL

2.7.-
CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES INTERVENIDOS DE CIRUGÍA RENAL

¿En que consiste la operación?

- ▶ Se administra anestesia general
- ▶ Consumo cuidado extraeran uno de los riñones y se lo transplantaran al respector
- ▶ La cirugía dura de 3 a 5 hrs.

Plan de acciones o cuidados. Acciones independientes:

- Recepción del paciente:
- Valorar nivel de conciencia
- Toma de signos vitales
- Observar signos de shock
- Medir diuresis horaria
- Llevar valance hidromineral
- Evitar hipotermias
- Mantener vías aéreas permeables
- Mantener barandas subidas hasta su recuperación
- Mantener higiene corporal y ambiental.

Acciones independientes

- Determinar nivel de discomfort.
- Cambio de posición c/2h
- Mantener buena alineación corporal
- Evaluar pulso c/1h.
- Masajear y proteger prominencia ósea
- Realizar ejercicios activos y pasivos
- Proveer medidas de confort
- Mantener privacidad del paciente
- Ayudar al paciente con la higiene
- Mover al paciente

Plan de acciones o cuidados. Acciones independientes

- Monitorear nivel de proteínas plasmáticas
- Valorar ruidos
- Brindar ambiente agradable
- Explicar necesidad de ingesta equilibrada de nutrientes
- Pesar diariamente al paciente
- No brindar falsas expectativas
- Brindar psicoterapia de apoyo
- Demostrar al paciente cuidados de HA.
- Explicar necesidades de AVP y sonda vesical.
- Monitorear signos de infección sistémica o infección local.
- Promover deambulación precoz
- Limitar contacto con personas ajenas.

2.8.- INFECCIONES URINARIAS


¿Que es? Es la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas.

Clasificación Las ITU son clasificadas en diversas formas: alta o baja, aguda o crónica, no complicada o complicada, sintomática o asintomática, nueva o recurrente y comunitaria o nosocomial.

2.8.- INFECCIONES URINARIAS

- ITU BAJA** Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que normalmente se asocian a la presencia de síntomas y signos urinarios.
- ITU ALTA** Presencia de signos y síntomas del ITU bajo, asociada a colonización bacteriana a nivel uretral y del parénquima renal.
- ITU NO COMPLICADA** Sin alteraciones funcionales o anatómicas sin una historia reciente de instrumentación y cuyos síntomas están confinados a las uretra y vejiga.
- ITU COMPLICADA** Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente.
- ITU o BACTERIURIA ASINTOMÁTICA** Muchas pacientes pueden tener una bacteriuria significativa sin presentar síntomas.
- ITU RECURRENTE** Más de tres episodios de ITU demostrados por cultivo en un periodo de un año.
- ITU NOSOCOMIAL** Aparición de infección urinaria a partir de las 48 hrs de la hospitalización de un paciente o evidencia de infección.

2.9.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS INFECCIONES URINARIAS



2.10.- ALTERACIONES UROLÓGICAS QUE REQUIEREN CIRUGÍA UROLÓGICA

ALTERACIONES UROLÓGICAS QUE REQUIEREN CIRUGÍA UROLÓGICA.

Las tres enfermedades que se desarrollan más frecuentemente a partir de la próstata son:

- > Hiperplasia benigna de Próstata
- > Cáncer de próstata
- > Prostatitis

¿Qué es la prostatitis?

- > Inflamación de la próstata producida habitualmente por una infección bacteriana.
- > Prostatitis bacteriana aguda
 - Cursa con fiebre alta, intensas molestias miccionales y a veces dificultad para orinar
- > Prostatitis bacteriana crónica.
 - Suele cursar con episodios repetidos de infección urinaria y entre los episodios puede no tener ningún síntoma.

¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata?

- > Es el crecimiento de la próstata fundamentalmente en la zona transicional que rodea la uretra
- > Manifestaciones clínicas
 - Polaquiuria
 - nicturia
 - Urgencia miccional
 - escape de orina

¿Qué es el cáncer de próstata?

- > Es un crecimiento maligno dentro de la próstata, con mayor frecuencia en la zona periférica.
- > Entre el 30 y 40% de los varones de 50 a 80 años pueden tener cáncer.

Tiempo de revisión

- Todo varón mayor de 45 años debería consultar con su urólogo una vez al año.

Bibliografía

UDS. (2020). Antología de Enfermería Médico Quirúrgico . En C. Zamorano.