



Nombre del alumno:

Mauricio Alejandro Gómez Aguilar.

Nombre del profesor:

Mahonrry de Jesús Ruiz.

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual.

Materia:

Patología del adulto.

Grado:

Sexto.

Grupo:

“C”

Patologías renales.

Píelo nefritis.

¿Qué es?

Es una infección de la uretra que afecta también a los riñones de manera más o menos grave, sus causas pueden ser diversas, aunque el motivo principal es la presencia de bacterias en la orina.

¿Qué síntomas produce?

Los síntomas incluyen:

- ❖ Fiebre.
- ❖ Micción frecuente.
- ❖ Dolor en la espalda.
- ❖ Dolor de los laterales.
- ❖ Dolor de la ingle.

El tratamiento principal y de elección de la pielonefritis (tanto aguda como crónica) es el uso de antibióticos, dependiendo del tipo de bacterias que han provocado la infección, el urólogo especialista escogerá un tipo de antibióticos u otro.

Litiasis renal.

¿Qué es?

Los cálculos renales (litiasis renal, nefrolitiasis) son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones.

¿Qué síntomas produce?

- ❖ Dolor al orinar.
- ❖ Orina de color rosa, rojo o marrón.
- ❖ Orina turbia o con olor desagradable.
- ❖ Náuseas y vómitos.
- ❖ Necesidad constante de orinar.
- ❖ Micciones más frecuentes de lo usual.
- ❖ Fiebre y escalofríos si existe una infección.
- ❖ Micciones en pequeñas cantidades.

Los tratamientos incluyen el uso de analgésicos y beber mucha cantidad de agua para ayudar a la eliminación del cálculo. Es posible que se necesiten procedimientos médicos para eliminar o desintegrar los cálculos de mayor tamaño.

Infección urinaria.

¿Qué es?

Una infección de las vías urinarias es una infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, la mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra).

¿Qué síntomas produce?

- ❖ Necesidad imperiosa y constante de orinar.
- ❖ Sensación de ardor al orinar.
- ❖ Orina de aspecto turbio.

- ❖ El tratamiento adecuado del primer episodio es fundamental para evitar la repetición de la infección urinaria.