



**Nombre de alumna: RODRÍGUEZ SILVA
GRACIELA YAZMÍN**

Materia: PRACTICAS PROFESIONALES

**Nombre del profesor: MA. DEL CARMEN
LOPEZ SILBA**

Semestre: 9º

Grupo: "A"

Licenciatura en Enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de julio del 2020, Viernes.

3.1.1 - Dolor de Cabeza

Las metastasis constituyen el 40% de las neoplasias intracraneales; la localización supratentorial es la más frecuente. En el 50% de los casos son múltiples en el momento del diagnóstico. La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina en los varones. Se presentan clínicamente con convulsiones o como defecto neurológico focal. Los tumores primarios que más metastatizan son las neoplasias pulmonares (50%), de mama (15%), melanomas (10%), de riñón, mama, tiroides, carcinoma y melanoma. Las lesiones quísticas o calcificadas suelen proceder del pulmón, mama o tubo digestivo. Son lesiones relativamente bien definidas y producen edema vaso genico periférico y moderado en la sustancia blanca. Tienden a localizarse en el parénquima vascularizado por el sistema carotideo, en la frontera entre la sustancia gris y la blanca.

3.1.2 - Dolor de Pecho

El dolor de pecho se presenta en diferentes formas; desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o arder. En otros, el dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos.

Síntomas

Puede provocar varias sensaciones diferentes según cuál sea el detonante de los síntomas.

- Dolor de pecho relacionado con el corazón:

Por lo general, la molestia en el pecho relacionada con un ataque cardíaco o con otro problema cardíaco se puede describir o relacionar con una o más de las siguientes:

* Presión, inflamación, ardor u opresión en el pecho

* Dolor opresivo o agudo que se extiende hasta la espalda, el cuello, la mandíbula, los hombros y uno o ambos brazos.

* Dolor que dura más de unas pocas minutos, empeora con la actividad, desaparece y vuelve a aparecer, o varía en intensidad.

* Falta de aire.

* Sudor frío

* Mareos o debilidad

* Náuseas o vómitos.

Causas Relacionadas con el corazón:

- Ataque cardíaco: El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco, con frecuencia, por un coágulo sanguíneo.

- Angina de pecho: Dolor de pecho causado por una irrigación sanguínea deficiente al corazón.

- **Disección aórtica:** Esta afección, que puede poner en riesgo la vida, afecta la arteria principal que sale del corazón.
- **Pericarditis:** Inflamación que del saco que rodea el corazón. Suele provocar un dolor intenso que empeora cuando inhalas o cuando te acuestas.

3.1.3- Dolor de Cuello.

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica. Se estima que más de la mitad de la población padece cervicalgia en algún momento de su vida, afecta en torno a un 10% de la población cada año, más del 50% de los pacientes relatan que no precisan estudios radiológicos o analíticos. Existe al 20% de pts. presentan síntomas que exceden en su duración de los 6 meses o son recidivantes con historia o exploración sugestiva de radiculopatía, lesión medular o enfermedad sistémica.

Síntomas.

Estos son algunos de los signos y síntomas:

- Dolor que suele empeorar si sostienes la cabeza en un lugar durante periodos largos, como cuando conduces o cuando trabajas frente a la computadora.
- Rigidez en las músculos o espasmos.
- Capacidad disminuida para mover la cabeza.
- Dolor de cabeza.